

KULLANMA TALİMATI

METACART 100 mg / 10 ml'lik i - eren flakon

A j e z d a n a l e n e r .

Etkin madde: 100 ml s a ğ ü ğ y o n d a r n i t i n i ç e r i r .

Y a r d e m c e M a d d e l e r : t , s o d y u m b e n z o a t , s a k a r i n

B u i l a c e k u l l a n m a y a b a k l a n m a t a l i m a t t a
o k u y u n u z , - i n k i s i z i n i - i n o n e m l i b i l g i
¶ B u k u l l a n m a t a l i m a t e n e s a k l a y e n e z . D
¶ E j e r i l a v e s o r u l a r e n e z o l u r s a , . l i t f e
¶ B u i l a - k i k i s e l o l a r a k s i z i n i - i n r e
¶ B u i l a c e n k u l l a n m e s e r a s e n d a , d o k t o
k u l l a n d e j e n e z e s o y l e y i n i z .
¶ B u t a l i m a t t a y a z e l a n l a r a a y n e n u y g u n
v e y a d i ğ e k u l l a n m a y e n e z .

B u K u l l a n m a T a l i m a t e n d a :

1. **METACART** n e d i r v e n e i - i n k u l l a n e l e r ?
2. **METACART** k u l l a n m a d a n o n c e d i k k a t e d i l m e s i g e
3. **METACART** t a s e l k u l l a n e l e r ?
- 4 . O l a s e y a n e t k i l e r n e l e r d i r ?
5. **METACART** k a k l a n m a s e

B a k l e k l a r e y e r a l m a k t a d e r .

1. METACART n e d i r v e n e i - i n k u l l a n e l e r ?

METACART L - k a r n i t i n a d l l e t k i n - k a r n i t i n e n e r j i m e t a b o l i z m a s ı i ç i n z o r u n l u o l a n d o ğ a l b i k a s l a r ı g i b i d o k u l a r i ç i n g e r e k l i o l a n e n m i t o k o n d r i (b i r h ü c r e i ç i o r g a n e l i) g i r i ŝ i n i k o l a y

METACART 100 m g / 10 m l ' l i k m e r l i r e n g i m b ŝ i ŝ e l e r ŝ e k l i n d e s u n u l r e n k l i s ı v ı g ö r ü n ü m ü n d e d i r .

METACART, Tıbbi yaşamdaki durumların tedavisinde kullanılır.

- ¶ Birincil karnitin yetersizliği,
- ¶ İkincil karnitin yetmezliği (hormonal etiyolojili yetmezliği dahil).

2. METACART'ın Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

METACART'ın Önemli Durumlarında KULLANMAYINIZ

- ¶ Eğer METACART'ı herhangi bir bileşenine karşı alerjik reaksiyona uğratmışsanız, kullanmayınız.

METACART'ın Önemli Durumlarında DİKKATLİ KULLANINIZ

- ¶ İnsulin veya oral hipoglisemik tedavi (ağız yoluyla tedavi) alan şekerli hastaların hipoglisemik (aşağı düşüklüğü) yol açabilir. Bu hastalarda izlenmelidir.
- ¶ METACART ile tedaviniz sırasında doktorunuzun hayati belirtileriniz, kan kimyanızı, periyodik olarak kontrol edebilir ve gerektirdiğinde doz ayarlamaları yapabilir.
- ¶ Diyaliz hastasıysanız veya ağır böbrek yetersizliği varsa, METACART'ın tedaviniz için yeterli olmayacağından (trimetilamin [TMA] ve trimetilamin-N-oksit [TMAO]) kanda birikmesi nedeniyle ağız yoluyla kullanılmaması önerilir. Yüksek dozlarda kullanılması gerektirir. Böyle bir birikim, idrarda, nefeste trimetilamin birikimine yol açar. Bu durumun METACART ile birlikte kullanılması önerilmez.
- ¶ METACART ile birlikte kullanıyorsanız, INR değerleriniz kontrol edilmelidir. Bu nedenle, değerleriniz normal (pıhtılaşma testleri) olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bu uyarı herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli değildir. Doktorunuza danışınız.

METACART'ın Önemli Durumlarında KULLANILMASI

METACART'ı yemek sırasında veya yemekten sonra kullanınız.

Hamilelik

KLACĒ ku h t a n m o d a n r ũ n u z d a n v ě e k y ě a n ě e z c z a c ě n ě z a

METACARTİN®'in kullanılması gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

T e d a v i n i z s ě r a s ě n d a h a m i l e o l d u y ũ a y a z a c f a c ě n ě z

Emzirme

KLACĒ ku l p h a d n o k a t d a r n u n u z a d a e n y a k a e n e z a c ě n ě z a

METACARTİN®'in emziren kadınlarda kullanılması önerilmez.

Arac ve makine kullanımı

METACARTİN®, araç veya makine kullanırken dikkatli olmak ve becerinizi

METACARTİN®'in etkilerini bazen yavaş yavaş öğrenmeniz gerekebilir.

METACARTİN® içeriğinde herhangi bir uyarı gerektirmez.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

İnsülin ile veya diğer ilaçlarla (ağız yoluyla alınan kan şeker hastalarında METACARTİN® uygulamadığınız sürece) birlikte kullanılabilir. METACARTİN® kullanırken diğer ilaçları doktorunuza danışınız.

METACARTİN® birlikte kan pıhtılaşmasını engeller (örneğin

varfarin) kullanıyorsanız, INR değerleriniz düzenli olarak

nedensiz olarak düşebilir, bu nedenle doktorunuza danışınız.

Testleriniz (başlangıçta haftalık, sonraki dönemlerde

Eğer - *g a t d a r l a - e h t a s h i a n g i k u b a r d a l k a c ě l a n ě y o r s a n ě z*

kullanılmadık sürede kullanmanız gerekebilir veya eczacıya danışınız.

3. METACARTİN®'i nasıl kullanmalıyım?

¶ Uygun kullanım ve idare talimatları, kullanma şekli ve

Yetiştiricilerde, 50 kg ağırlığında - *B d e f a h g ' s d a r i c i*

(1 g L-karnitin).

Tedaviye günde kg başına 50 mg'lık dozla başlayarak artırılmalıdır.

İlacı olan tahammülünüz tedavinin ilk hafta tarafından yakından izlenir.

Tedavinin devamı yetmezliğin 12 saatına kadar değişir; bazı hastalarda hayati devam tedavinizin süreceğini

¶ Uygulama yolu ve metodu:

Çözeltiyi içeceklerle sulandırıldıktan sonra bölünmeli, tercihen yemek sırasında veya yemek

¶ Değişiklikupandır:

Çocuklarda ve bebeklerde 100 mg'lık karnitin'dir. Günde en çok 3 g'a kadar çıkılır.

Yakılarda kullanımına ilişkin

¶ Kullanılan durumlar:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda önerilmemektedir.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda bulunmamaktadır.

ETACIN'in -oğuz-ya zayıf olduğuna dair doktorunuz veya eczacınız ile konu

Kullanmanız gereken haftasız:

ETACIN ile aşıldığı belirtilenme olabilir. Bu durumda doz azaltılmalı ve dest

ETACIN kullanmanız gerekmez. aşıldığı belirtilenme ile konuz

METACARNİT kullanmayē unuttur sanē z

Unutul an doz l a - i d f o t z e n a g l a m l a e y m ē e n k ē z .

METACARNİT ile tedav i j ē n d a b i l e r k i l e r ē l d ē

L-karnitin fizyolojik bir üründür ve bu sebepten

4 . O l a s ē y a n e t k i l e r n e l e r d i r ?

Tüm ilaçlar g i n ' b i i n M i e t e r c i a g r i t n d e b u l u n a n m a d d e l e r e t k i l e r o l a b i l i r .

A k a j ē d a k i l e r d e M E T A C A R N İ T kullanırsan, a y ē d u r d u r u n u z

d o k t o r u n u z a b i l d i r i n i z v e y a s i z e e n y a k ē n h a

¶ N ö b e t

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir . A c i l t i

Yan etkiler a ş a ğ k d a k i g o r i l e r ş d e k i g l ö d s e t e s n i n l i d f i l ğ a i n d i r i l m i ş t

Ç o k y a y g : 1 0 h a s t a n ı n e n a z 1 ' i n d e g ö r ü l e b i l

Y a y g ı n : 1 0 h a s t a n ı n b i r i n d e n a z , f a k a t 1 0 0

Y a y g ı n o : 1 m i l y o n h a s t a n ı n b i r i n d e n a z e n f a k a t 1 0

Seyrek : 1 . 0 0 0 b i r i n d e n a z , n f a k a t 1 0 . 0 0 0 h a s t a n ı n g ö r ü l e b i l i r .

Ç o k s e y r e k 1 0 . 0 0 0 h a s t a n ı n b i r i n d e n a z g ö r ü l e

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Seyrek:

¶ B u l a n t ı

¶ K u s m a

¶ İ s h a l

¶ M i d e k r a m p l a r ı

Ç o k s e y r e k :

¶ B a l ı k k o k u s u n a b e n z e r v ü c u t k o k u s u (d o z u n k a l k a b i l i r)

¶ I N R d e ğ e r l e r i n d e a r t ı ş (k a n p ı h t ı l a ş m a y e t

Bilinmiyor:

¶ Hafif kas güçsüzlüğü a b e l m o t m a d e r i m ü k a n d a k i
E f e r b u k u l l a n m a t a l i m a t e n d a b a h s i g e - m e y e
d o k t o r u n u z u v e y a e c z a c e n e z e b i l g i l e n d i r i n i z .

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan
durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşire
etkileri www.titck.gov.tr sitesinde r a k y a e r a l a
da 0 8 0 0 3 1 4 0 0 0 8 numaralı yan etki bildi
Merkezi (TÜFAM) ' ne bildiriniz . Meydana gel
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha
olacak sınırlıdır .

5. METACANTHİ saklanması

M E T A C A N T K u g l ° a r r e e m e , y e d e k i m y e t e f d e v e a m b a l a j e
25 ° C ' n i n a l t t n d a k i o d a s ı c a k l ı ğ ı n d a s a k l a y ı n ı
S o n k u l l a n m a t a r i h i y l e u y u m l u o l a r a k k u l l a n e
Son kullanma tarihi ge ç m i ş v e y a k u l l a n ı l m a y a n i l a ç l a r ı
B a k a n l ı ğ ı n c a b e l i r l e n e n t o p l a m a s i s t e m i n e v e

K u t u ç z e r i n d e y a z e l e o l M E T A C A N T K u d a h m a m a y e n i b

Ruhsat sahibi: World Medicine İ l a ç S a n a y i v e T i c a r e t A . Ş .

B a ğ c ı l a r / İ S T A N B U L

İ r e t i m F y e m a m a g A m b a l a j S a n a y i v e T i c a r e t A . Ş

B a ğ l a r ı ç ı C a d d e s i N o : 1 4 K a t : 2

A v c ı l a r / İ S T A N B U L

B u k u l l a n e n e t t a r i h i n d e n a n t a y l a n m e k t e r .