

KULLANMA TALİMATI

BRICANYL® 2,5 mg tablet
Ağız yoluyla kullanılır.

- **Etkin maddeler:** Her tablette 2,5 mg terbütalin sülfat bulunur.
- **Yardımcı maddeler:** Laktoz monohidrat (sığıır sütünden elde edilmiştir), mısıır nişastası, Povidon, mikrokristalin selüloz ve magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **BRICANYL® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **BRICANYL® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **BRICANYL® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **BRICANYL®'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. BRICANYL® nedir ve ne için kullanılır?

BRICANYL®, solunum yolunu genişleterek nefes almayı kolaylaştırır.

BRICANYL® astımlı hastalarda veya diğer benzer durumlarda nefes daralması gibi belirtileri rahatlatmak için kullanılır. BRICANYL® astım tedavisinde beklenen solunum problemlerini önlemek için kortikosteroid içeren tedavinin yanında düzenli tedavi olarak kullanılır. **Ancak, BRICANYL®, başlamış olan akut bir astım atağını iyileştirmez.**

2. BRICANYL® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BRICANYL®'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Terbütalin'e veya BRICANYL® içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız olması durumunda kullanılmamalıdır.

BRICANYL®'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Hamile iseniz ve hamileliđiniz ile ilgili sorun yaşıyorsanız,
- Tiroid bezi fonksiyonunda artış (hipertiroidi),
- Diyabet (kan řekeri bozukluđu),
- Kalp hastalıđı, düzensiz kalp ritmi veya anjina pektoris (damar spazmı),

BRICANYL®'in etkisinin azaldıđını ve normalden fazla doz alma ihtiyacınız olduđunu fark ederseniz doktorunuzla iletiřime geçmeniz gerekmektedir. Tedavinizin izlenmesi gerekebilir. Doktorunuzla konuřmadan BRICANYL® dozunuzu arttırmayınız.

Bu uyarılar geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

BRICANYL® ile tedaviye bařlamadan önce, doktorunuzu hamile olduđunuz veya hamile kalmayı planladıđınız konusunda bilgilendiriniz. BRICANYL hamileliđin ilk üç ayında dikkatli bir řekilde uygulanmalıdır.

Hamileyseniz, ilaç kullanımını konusunda her zaman çok dikkatli olmalısınız. BRICANYL® rahim kaslarını rahatlattıđından gebeliđin son döneminde dikkatle kullanılmalıdır.

BRICANYL® anne ve bebekte kalp ve akciđer problemlerine yol açabilir. Bu nedenle gebelik ve dođumla ilgili durumlarda doktorunuz tarafından kesinlikle gerekli olduđu söylenmedikçe kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

BRICANYL® ile tedaviye bařlamadan önce, doktorunuza emzirmekte olduđunuzu söyleyiniz. Emzirme durumunda, ilaç kullanımını konusunda her zaman çok dikkatli olmalısınız.

Araç ve makine kullanımı

BRICANYL®'in sizin araç veya makine kullanımınızı etkilemesi muhtemel deđildir.

BRICANYL®'in içeriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BRICANYL®, bir tür řeker olan laktoz içerir. Eđer daha önceden doktorunuz tarafından bazı řekerlere karřı intoleransınız (dayanıksızlıđınız) olduđu söylenmiřse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diđer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Herhangi bařka bir ilaç alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya almayı planlıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Bu, reçetesiz satın aldıđınız ilaçları ve bitkisel ilaçları da içerir. Bazı ilaçlar BRICANYL® tedavisini etkileyebilir veya BRICANYL® tedavisi bazı ilaçları etkileyebilir, örneđin:

- Steroid ilaçlar (prednizolon gibi).
- Ksantin türevi ilaçları (teofilin veya aminofilin gibi).
- Göz damlaları (timolol gibi) de dahil olmak üzere beta blokör ilaçlar (atenolol veya propranolol gibi).
- Diüretik olarak da bilinen su tabletleri (furosemid gibi).

Cerrahi bir işlem öncesi genel anestezi almadan önce doktorunuzu BRICANYL® aldığınızdan haberdar edin. Genel anestezikler düzensiz kalp atışlarına neden olabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BRICANYL® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Bu ilacı her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Etiket üzerindeki talimatlar size doktorun söylediğini hatırlatmalıdır.

Astım ve solunum problemleri için

BRICANYL®, 7 ila 8 saatlik bir etki süresine sahiptir. Bu nedenle en az 7 saat ara verilerek kullanılmalıdır

Erişkinler:

İlk 1-2 hafta içinde günde 3 defa 2,5 mg (1 tablet) önerilir. Doz, gerekiyorsa daha sonra günde 3 defa 5 mg'a (2 tablet) yükseltilebilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan alınır.

Aşağıdaki durumlarda doktorunuza danışın:

- Solunumunuz daha da kötüleşiyorsa.
- Sıklıkla astımlı bir şekilde uyanıyorsanız.
- Göğüs sıkışmaları başladıysa.
- Şu andaki dozunuzdan rahatlayamıyorsanız.

Bu bulgular, astımın kontrol altına alınmadığı anlamına gelir ve hemen farklı veya ek tedaviye ihtiyacınız olabilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda Kullanımı (7-15 yaş):

Başlangıç dozu normalde 24 saatte 2 kez 2,5 mg (1 tablet) olmalıdır. Bununla birlikte, bazı hastalarda ilacın dozu 24 saatte 3 kez 2,5 mg (1 tablet) uygulanabilir.

Yaşlılarda Kullanımı:

Yetişkinlerle aynı doz kullanılır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Veri yoktur.

Eğer BRICANYL®'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BRICANYL® kullandıysanız

BRICANYL®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktorunuzun size reçete ettiğinden daha fazla tablet kullanmayınız.

Eğer BRICANYL® dozunu almayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir doz almayı unutmuşsanız, dozu almayı unuttuğunuzu hatırlar hatırlamaz alınız. Ancak eğer bu, bir sonraki doz zamanına çok yakınsa, bir sonraki doza kadar bekleyiniz.

BRICANYL® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

İlacınızı doktorunuza danışmadan kullanmayı bırakmayınız.

Bu ilacın kullanımını hakkında başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi BRICANYL®'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa BRICANYL®'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Alerjik reaksiyonlar. Belirtiler; şişmiş yüz, deri döküntüleri, nefes darlığı problemleri, düşük kan basıncı (bayılma hissi) ve ani çöküş içerebilir. Bunun ne sıklıkta gerçekleştiği bilinmiyor. Bu gibi durumlarla karşılaşırsanız, BRICANYL® almayı bırakınız ve hemen bir doktora danışınız.
- BRICANYL® aldıktan hemen sonra hırıltılı gelişebilir. Bunun ne sıklıkta gerçekleştiği bilinmiyor. Bu gibi durumlarla karşılaşırsanız, BRICANYL® almayı bırakınız ve hemen bir doktora danışınız.

BRICANYL® e başladıktan sonra kan şekerinizi daha sık ölçmeniz gerekebilir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BRICANYL®'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer yan etkiler:

Görülebilecek diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın

- titreme
- baş ağrısı

Yaygın

- kalbinizin hızlı atması (çarpıntı ve çarpıntı hissi (palpitasyon))
- kas krampları
- kandaki potasyum seviyelerinde azalma, kas güçsüzlüğüne, susama ya da karıncalanmalar oluşturabilir.

Bilinmiyor*

- kalp ritim bozuklukları (Atrial fibrilasyon, supraventriküler taşikardi ve ekstrasistoller dahil kardiyak aritmiler)
- göğüs ağrısı (angina gibi kalp problemlerine bağlı olarak). BRICANYL® ile tedavi gördüğünüzde bu semptomu geliştirirseniz doktorunuza bildirin, fakat söylenmediği sürece bu ilacı kullanmayı bırakmayın.
- mide bulantısı (hasta hissetme)
- ağız ve boğaz tahrişi
- uyusukluk hissi, huzursuzluk veya "hiperaktif" gibi uyku düzenindeki değişiklikler ve davranış değişiklikleri.
- döküntü, kurdeşen (ürtiker)
- kol ve bacak damarlarında genişleme (Periferik vazodilatasyon)
- kalp kasının bir kısmının oksijensiz kalması

*Bu yan etkiler pazarlama sonrası raporlardan elde edilmiştir ve bu sebeple yaygınlığı bilinmemektedir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. BRICANYL®’in saklanması

BRICANYL®’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. BRICANYL®’i etiketinde ve dış ambalajında belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

AstraZeneca PLC, İngiltere lisansı ile
AstraZeneca İlaç San. ve Tic.Ltd.Şti.
Büyükdere Cad.Yapı Kredi Plaza B Blok Kat 4
Levent - İstanbul

Üretim Yeri:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Büyükkarıştıran 39780 Lüleburgaz-Kırklareli

Bu kullanma talimatı __/__/__ tarihinde onaylanmıştır.