

KULLANMA TALİMATI

CLONEX® 25 mg tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:**

25 mg klozapin içerir.

- **Yardımcı madde(ler) :**

Laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı), povidon, prejelatinize nişasta, mısır nişastası, talk, koloidal anhidr silika, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında;

1. ***CLONEX nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***CLONEX'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***CLONEX nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***CLONEX'in saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. CLONEX nedir ve ne için kullanılır?

CLONEX tabletler etkin madde olarak klozapin içerir. CLONEX, antipsikotikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

CLONEX tabletler, yuvarlak, sarı renkli, bir yüzü çentikli ve diğer yüzünde “CPN 25” yazılı, eşit yarımlara bölünebilir tabletlerdir ve 50 adet tablet içeren blister ambalajlarda sunulmaktadır.

CLONEX diğer antipsikotik ilaçları denemiş ve bu ilaçlardan yeterince fayda sağlayamamış ya da yan etkileri nedeniyle diğer antipsikotik ilaçları tolere edemeyen şizofreni hastalarının tedavisinde kullanılır.

CLONEX ayrıca, aksi takdirde intihar girişiminde bulunabilecek şizofreni ya da şizoafektif bozukluk (duygu-durum bozukluklarının gözlendiği şizofreni) gözlenen hastaların tedavisinde de kullanılır.

Şizofreni düşünce, duygu ve davranış bozuklukların gözlendiği ruhsal bir bozukluktur.

Ayrıca, CLONEX standart tedavi başarısız olduğunda Parkinson hastalarındaki düşünce, duygu ve davranış bozukluklarının tedavisinde de kullanılır. Parkinson hastalığı kronik (kalıcı) bir beyin hastalığıdır. Bu hastalık başlıca, beynin vücudun değişik bölümlerindeki kasların hareketlerini koordine etme şeklini etkiler.

CLONEX yalnızca doktor reçetesi ile kullanılabilir.

2. CLONEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLONEX kullanmaya başlamadan önce, bu ilacı kullanıp kullanamayacağınızın belirlenmesi için size bir kan testi yapılacaktır. CLONEX kullanmaya devam ettiğiniz sürece ve tedavinin kesilmesini takiben 4 hafta boyunca düzenli olarak kan testi yaptıracaksınız. Doktorunuz testlerin ne zaman yapılacağını size söyleyecektir. Doktorunuzun önerdiği tüm kan testlerini yaptırmanız önemlidir.

CLONEX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

- Klozapine ya da CLONEX’in bu kullanma talimatının başında listelenen yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
- Düzenli olarak kan testi yaptırılmıyorsanız,

- Kanser tedavisini takiben hariç olmak üzere, daha önce size düşük beyaz kan hücresi teşhisi konmuş ise,
- Daha önce kemik iliği hastalığı yaşadığınız ya da şu anda yaşıyorsanız,
- Kemik iliğinizin uygun şekilde çalışmasını engelleyen ilaçlar kullanıyorsanız,
- Kanınızdaki beyaz hücre sayısını azaltan ilaçlar kullanıyorsanız,
- Daha önce şiddetli yan etkilerden ötürü (örn., agranüloz veya kalp problemleri) CLONEX kullanımını bıraktıysanız,
- Karaciğer, böbrek ya da kalp problemleriniz varsa,
- Kontrolsüz nöbetleriniz varsa,
- Alkol ya da ilaç suistimali sorunuz varsa,
- Alkol veya ilaçların neden olduğu akut bir zihinsel hastalığınız varsa (örn., narkotikler),
- Kalp kasında iltihap varsa (miyokardit)
- Başka bir şiddetli kalp hastalığınız varsa,
- Şiddetli böbrek hastalığınız varsa,
- Sarılık gibi (deri ve gözlerde sararma, hasta hissetme ve iştah kaybı) aktif karaciğer hastalığı belirtileriniz varsa,
- Başka bir şiddetli karaciğer hastalığınız varsa,
- Azalmış bilinç ve şiddetli baş dönmesi yaşıyorsanız,
- Şiddetli bir şok sonucunda görülebilecek dolaşım çökmesi yaşıyorsanız,
- Uzun etkili depo antipsikotik enjeksiyonları ile tedavi ediliyorsanız veya daha önce edildiyse,
- Daha önce şiddetli kabızlık, bağırsak tıkanması ya da kalın bağırsağınızı etkileyen diğer bir durum yaşadığınız.

CLONEX'e (klozapin) alerjik olduğunuzu düşünüyorsanız CLONEX almadan önce doktorunuza danışınız.

CLONEX’i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eđer:

- Nezle, grip, ateř, bođaz ađrısı ya da diđer herhangi bir enfeksiyona iliřkin ilk belirtide hemen doktorunuza danıřın. CLONEX kanınızdaki beyaz hücreslerin sayısını azaltarak enfeksiyona karřı olan hassasiyetinizin artmasına neden olabilir. Doktorunuz kan hücresi sayımınızı kontrol edip, gerektiđinde ilave önlemler alabilir.
- Dinlenirken bile kalp atıřlarınız hızlı ve düzensiz ise; çarpıntı, nefes alma sorunları, göđüs ađrısı ya da açıklanamayan yorgunluk yařadığınız takdirde, doktorunuza danıřın. Bu etkiler özellikle tedavinin bařlangıcında meydana gelebilir ve doktorunuzun ek önlemler alması gerekebilir.
- Prostat büyümesi, konvülsiyon (nöbet), glokom (gözdeki sıvı basıncının genellikle çok yüksek olduđu bir durum), diyabet (řeker hastalıđı) ya da diđer herhangi ciddi bir tıbbi durumunuz varsa, bunu doktorunuza ya da eczacınıza bildirin.
- Eđer inme veya kalp hastalıđı geçirdiyseniz veya aile geçmişinizde “QT aralıđının uzaması” adı verilen kalpte ileti sorunu mevcutsa bu durumu doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.
- Bunama (demans) ile ilgili bir durumunuz varsa bunu doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.
- Eđer normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi olarak ifade edilir) durumu yařıyorsanız veya yařadıysanız ve aldıđınız ilaçlar normal beyin aktivitelerini yavařlatıyorsa (depresanlar) bu durumu doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.
- CLONEX seyrek olarak toplar damarda kan pıhtısı oluřumuna yol ačan bir olaya (Venöz tromboembolik olay) neden olabilir.
- CLONEX kullanırken, özellikle tedavinin bařlangıcında bař dönmesi ya da bayılma yařayabilirsiniz. Bunun nedeni kan basıncınızın düşmesidir.
- Vücut sıcaklığında ani hızlı bir artıř, kaslarda bilinç kaybına neden olabilecek bir katılık (nöroleptik malign sendrom) yařıyorsanız; acil tedavi gerektiren ciddi bir yan etki yařıyor olabilirsiniz.
- řiddetli kabızlık yařıyorsanız. Doktorunuz ilave komplikasyonları önlemek üzere bu durumu

tedavi edecektir.

- Eğer şeker (diyabet) hastalığınız varsa doktorunuz kanınızdaki şeker düzeyini düzenli olarak kontrol edebilir. CLONEX kan lipidlerinde değişikliğe neden olabilir. CLONEX kilo artışına neden olabilir. Doktorunuz kilonuzu ve kan lipid düzeylerinizi izleyebilir.
- CLONEX ile ölüme neden olabilen kalp krizleri bildirilmiştir.
- CLONEX bazı hastalarda kilo artışına ve uyku haline neden olabilir ve yatakta daha uzun süre kalmanıza yol açabilir. Bu durum kan pıhtılaşmasına yol açabilir.
- Karaciğer hastalığı stabil (kontrol altında) olan kişiler CLONEX kullanabilir, ancak karaciğer fonksiyon testlerinin düzenli değerlendirilmesi gereklidir. CLONEX tedavisi sırasında bulantı, kusma ve/veya anoreksi (yeme bozukluğu) gibi belirtiler yaşıyorsanız bunu doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.
- Hafif ila orta şiddette böbrek hastalığınız varsa doktorunuz doz ayarlamasına karar verecektir.
- 60 yaş ve üzerinde iseniz, doktorunuzun tedavinizi düzenlemesi gerekebilir.
- CLONEX'in aniden kesilmesini takiben akut yoksunluk belirtileri (sersemlik, iğneleme gibi karıncalanma hissi, uyku bozuklukları, huzursuz hissetme, güçsüzlük, bulantı, kusma, titreme, baş ağrısı) bildirildiğinden doktorunuz dozu aşamalı olarak azaltacaktır. Ani kesme gerekli olur ise (örn., lökopeni nedeniyle) doktorunuz psikotik belirtiler ve aşırı terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma ve diyare gibi kolinerjik rebound (geri tepme) ile ilişkili belirtiler açısından gözlem yapabilir.

CLONEX ile tedaviye başlamadan önce, tedavi sırasında ve CLONEX ile tedaviyi bıraktıktan sonra düzenli kan testleri olduğunuzdan emin olunuz.

- Bu testleri tam olarak ne zaman ve nerede olmanız gerektiğini doktorunuz size söyleyecektir. CLONEX sadece kan sayımınız normale alınabilir.

- CLONEX, kanınızdaki beyaz hücrelerin sayısında ciddi bir düşüşe neden olabilir (agranülositoz). Sadece düzenli kan testleri, agranülositoz geliştirme riski altında olup olmadığımızı doktorunuza gösterebilir.

- Tedavinin ilk 18 haftası süresince testler haftada bir gereklidir. Sonrasında ayda en az bir kez testler gerekir.

- Eğer beyaz kan hücrelerinizin sayısında bir düşüş varsa, CLONEX tedavisini derhal durdurmanız gerekecektir. Sonrasında beyaz kan hücrelerinizin normale dönmesi gerekir.

- CLONEX tedavisi sona erdikten sonra 4 hafta daha kan testleri olmanız gerekecektir. Doktorunuz ayrıca tedaviye başlamadan önce bir fizik muayene de yapacaktır. Doktorunuz, kalbinize bakmak için bir elektrokardiyogram (EKG) de yapabilir fakat bunu sadece sizin için gerekli ise veya özel endişeleriniz varsa yapacaktır.

Eğer bir karaciğer hastalığınız varsa, CLONEX almaya devam ettiğiniz sürece düzenli karaciğer fonksiyon testleri olacaksınız. Eğer kanınızdaki şeker düzeyi yüksekse (şeker hastalığı, diyabet), doktorunuz kanınızdaki kan şekerini düzenli olarak ölçebilir.

CLONEX kan lipitlerinde farklılaşmaya neden olabilir. CLONEX kilo artışına neden olabilir.

Doktorunuz kilonuzu ve kan lipit düzeyinizi takip edecektir.

Eğer CLONEX sizde baş dönmesine, sersemlik haline veya baygınlığa yol açıyorsa, oturur veya yatar vaziyetteyken ayağa kalkarken dikkatli olunuz.

Eğer ameliyat olmanız gerekiyorsa veya herhangi bir nedenle uzun bir süre yürüyemeyecekseniz, CLONEX almakta olduğunuz konusunda doktorunuzla görüşünüz. Tromboz (bir damar içerisinde kan pıhtısı) açısından risk altında olabilirsiniz.

Çocuklar ve 16 yaş altı ergenler

Eğer 16 yaşın altındaysanız CLONEX kullanmamanız gerekir çünkü bu yaş grubunda kullanımı ile yeterli bilgi mevcut değildir.

Yaşlı kişiler (60 yaş ve üzeri)

Yaşlı kişilerin (60 yaş ve üzeri), CLONEX ile tedavi sırasında aşağıdaki yan etkileri yaşama olasılığı daha fazladır: pozisyon değiştirdikten sonra baygınlık veya baş dönmesi, sersemlik hali, hızlı nabız, idrara çıkmakta zorlanma ve kabızlık.

Demans (bunama) adlı bir durumdan muzdaripseniz bunu doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CLONEX'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

CLONEX tableti yemeklerle ya da a karnına alabilirsiniz.

Alkol ile etkileşim: CLONEX, alkolün etkilerini arttırabilir. CLONEX alırken alkol kullanmamalısınız.

Sigarayı bırakmanız ya da bir günde içtiğiniz kafein ieren ieceklerin sayısındaki deęişiklik, kandaki CLONEX düzeylerini etkileyebilir. Alışkanlıklarınızda bu tür deęişiklikler olursa doktorunuza bildiriniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, CLONEX kullanmadan önce bunu doktorunuza bildirin. Doktorunuz sizi hamilelik sırasında bu ilacı kullanmanın potansiyel riskleri ve faydaları konusunda bilgilendirecektir.

Antipsikotik ilaç kullanan bazı kadınlarda adetler düzensiz olmakta ya da hiç adet gözlenmemektedir. Eđer böyle bir durum yaşıyorsanız, ilacınızı CLONEX'le deęiştirdiğinizde yeniden adet görmeye başlayabilirsiniz. Bu tip durumlarda, güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullandığınızdan emin olmalısınız.

Gebeliğinin son üç ayında antipsikotik kullanan annelerden yeni doğan bebekler; doğumdan sonra kol ve bacaklarda katılık, titreme, huzursuzluk, kas sertlięi, kas gevşeklięi, uyku hali, solunum güçlüğü ve beslenme bozuklukları açısından artmış bir risk taşıyabilir.

Bu vakaların bazılarında belirtiler kendi kendine düzelme gösterebilirken, bir kısmında bebeklerin yoğun bakım ünitesi desteęi almaları veya hastaneye yatırılmaları gerekebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, bunu doktorunuza ya da eczacınıza bildirin. CLONEX'in etkin maddesi klozapin anne sütüne geçip, bebeği etkileyebilir. CLONEX tedavisi sırasında emzirmemelisiniz.

Araç ve makine kullanımı

CLONEX, özellikle de tedavinin başında yorgunluğa, uyku haline ve nöbetlere yol açabilir. Sizde bu belirtiler varken araç kullanmamalı veya makine çalıştırmamalısınız.

CLONEX'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CLONEX tabletler laktoz içerir. Doktorunuz size bazı şekerlere (örneğin; laktoz) karşı toleransınız olmadığını söylediye, CLONEX kullanmaya başlamadan önce doktorunuza bunu bildiriniz.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

CLONEX kullanmaya başlamadan önce, başka bir ilaç kullanıyorsanız ya da yakın zamanda kullandıysanız doktorunuza söyleyiniz. Bu ilaçlar arasında reçetesiz temin edilen ilaçlar veya bitkisel tedaviler de yer alır. İlaçlarınızın miktarında değişiklik yapmanız ya da başka ilaçlar kullanmanız gerekebilir.

CLONEX kemik iliği fonksiyonunu baskılayan ve/veya vücudun ürettiği kan hücrelerinin sayısını azaltan ilaçlarla eş zamanlı kullanılmamalıdır. Bu ilaçlara örnekler:

- Karbamazepin (sara hastalığında kullanılan bir ilaç).
- Belirli antibiyotikler: kloramfenikol, kotrimoksazol gibi sülfonamidler.
- Belirli ağrı kesiciler: fenilbutazon gibi pirazolon analjezikleri.
- Penisilamin (romatizmal eklem iltihabının tedavisinde kullanılan bir ilaç).
- Sitotoksik ajanlar (kemoterapide kullanılan ilaçlar).
- Antipsikotik (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili) ilaçların uzun etkili depo enjeksiyonları.

Bu ilaçlar sizde agranülositoz (beyaz kan hücreleri eksikliği) gelişme riskini artırır.

CLONEX kullanmak diğer ilaçlarınızın etki oranını değiştirebilir ya da bu ilaçlar CLONEX'in etki oranını değiştirebilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

- Lityum, fluvoksamin, trisiklik antidepresanlar, MAO inhibitörleri, sitalopram, paroksetin, fluoksetin ve sertralin gibi depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar.
- Perazin gibi ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılan diğer antipsikotik (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili) ilaçlar.
- Benzodiazepinler ve endişe ya da uyku bozukluklarının tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar.
- Narkotik ilaçlar ve nefes almanızı etkileyebilecek diğer ilaçlar.
- Fenitoin ve valproik asit gibi sara hastalığının kontrolünde kullanılan ilaçlar.
- Adrenalin ve noradrenalin gibi yüksek ya da düşük kan basıncını tedavi etmede kullanılan ilaçlar.
- Varfarin (kan pıhtılaşmasını önlemede kullanılan bir ilaç).
- Antihistaminikler (soğuk algınlıkları veya saman nezlesi gibi alerjiler için kullanılan ilaçlar).
- Antikolinergik ilaçlar (mide krampları, kasılmalar ve seyahat hastalıklarını rahatlatmada kullanılan ilaçlar).
- Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar.
- Digoksin (kalp problemlerinin tedavisinde kullanılan bir ilaç).
- Hızlı ya da düzensiz kalp atışının tedavisinde kullanılan ilaçlar.
- Omeprazol veya simetidin gibi mide ülserlerinin tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar.
- Eritromisin ve rifampisin gibi bazı antibiyotik ilaçlar.
- Mantar enfeksiyonları (ketokonazol gibi) veya viral enfeksiyonların (HIV enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan proteaz inhibitörleri gibi) tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar.
- Atropin (bazı göz damlaları veya öksürük ya da soğuk algınlığı preparatlarında kullanılabilen bir ilaç).
- Adrenalin (acil durumlarda kullanılan bir ilaç).

- Hormonal kontraseptifler (doğum kontrol ilaçları)

Bu liste tam değildir. Doktorunuz veya eczacınız CLONEX kullanırken dikkat etmeniz veya kullanmaktan kaçınmanız gereken ilaçlarla ilgili daha fazla bilgi verecektir. Ayrıca doktorunuz veya eczacınız kullandığınız ilaçların yukarıda listelenmiş gruplara ait olup olmadıklarını da bildiğinden, onlara bilgi veriniz.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CLONEX nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuzun talimatlarını dikkatle uygulayınız. Önerilen dozu aşmayınız.

Doktorunuz tam olarak kaç tablet CLONEX almanız ve bu tabletleri ne sıklıkta kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

Tedaviye dirençli şizofreni hastaları:

Her zamanki başlangıç dozu, birinci günde bir veya iki kez 12,5 mg (25 mg tabletin yarısı), ardından ikinci günde bir veya iki kez 25 mg şeklindedir. Tabletleri su ile yutunuz. İyi tolere ediliyorsa doktorunuz daha sonra dozu takip eden 2-3 haftada 25-50 mg'lık adımlarda, günde 300 mg'a kadarki bir doza ulaşıncaya kadar aşamalı olarak artıracaktır. Bunun sonrasında günlük doz, eğer gerekli ise, haftada iki kez ya da tercihen bir haftalık aralıklarda 50 ila 100 mg'lık adımlarda artırabilir.

Etkili günlük doz genellikle günde birkaç tek doz halinde bölünen 200 mg ile 450 mg arasındadır. Bazı kişiler daha fazlasına gerek duyabilir. Günde 900 mg'a kadar günlük dozlara müsaade edilir. 450 mg'ın üzerindeki günlük dozlarda yan etkilerde artış olasıdır (özellikle nöbetler). Her zaman sizin için etkili olan en düşük dozu alınız. Çoğu kişi dozlarının bir kısmını sabah ve bir kısmını akşam alır. Doktorunuz günlük dozu tam olarak nasıl bölceğinizi size söyleyecektir. Eğer günlük dozunuz sadece 200 mg ise, akşam tek doz olarak alabilirsiniz. Belirli bir süre boyunca CLONEX'i başarıyla aldıktan sonra doktorunuz size daha düşük bir dozu denetebilir.

CLONEX'i en az 6 ay almanız gerekecektir.

Şizofrenide ve şizoafektif bozuklukta intihar davranışı riskinin azaltılması:

Tedaviye direnç gösteren şizofreni hastalarında CLONEX kullanımına ilişkin yukarıda belirtilen doz ve uygulama tavsiyelerine, nükseden intihar davranışı riski taşıyan şizoafektif bozukluğu olan hastalarda veya şizofreni hastalarında da uyulmalıdır.

İntihar davranışı riskinin azaltılmasını devam ettirmek için, en az iki yıl boyunca CLONEX ile tedavi önerilir. İki yıllık tedavi sonucunda intihar davranışı riskinizin yeniden değerlendirilmesi önerilir ve bundan sonra tedavi süresince intihar davranışı riskinin ayrıntılı değerlendirilmesi esas alınarak CLONEX tedavisine devam edilme kararı belirli aralıklarla doktorunuz tarafından yeniden değerlendirilir.

Parkinson hastalarında düşünce, duygu ve davranış bozukluklarının tedavisi:

Her zamanki başlangıç dozu, akşam alınan 12,5 mg'dır (25 mg tabletin yarısı). Tabletleri su ile yutunuz. Doktorunuz daha sonra dozu 12,5 mg'lık adımlarla, haftada iki adımdan daha hızlı olmamak kaydıyla, ikinci hafta sonunda maksimum 50 mg dozuna kadar aşamalı olarak yükseltecektir. Eğer baygınlık, baş dönmesi veya zihin karışıklığı hissediyorsanız dozajdaki artışlar durdurulabilir veya ertelenebilir. Bu tür belirtilerden kaçınmak için tedavinin ilk haftalarında kan basıncınız ölçülecektir.

Etkili günlük doz genellikle akşam tek doz halinde alınan 25 mg ile 37,5 mg arasındadır. Günde 50 mg'lık dozlar sadece istisnai durumlarda aşılmalıdır. Maksimum günlük doz 100 mg'dır. Her zaman sizin için etkili olan en düşük dozu alınız.

CLONEX'i her gün aynı saatte almanız, ilacı ne zaman almanız gerektiği konusunda size yardımcı olacaktır.

Uygulama yolu ve metodu:

CLONEX tablet yalnızca ağız yoluyla kullanılır. CLONEX tableti yemeklerle ya da aç karnına alabilirsiniz. Tableti bir bardak su ile yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

CLONEX'in çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:

Eğer 60 yaş ve üzerinde iseniz, doktorunuzun tedavinizi ayarlaması gerekebilir.

Özel kullanım durumları:**Böbrek/Karaciğer yetmezliği :**

CLONEX tabletler böbrek ve karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Doktorunuz CLONEX ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü CLONEX tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer CLONEX'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CLONEX kullandıysanız:

CLONEX'ten kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer yanlışlıkla kullanmanız gerekenden daha fazla tablet aldıysanız, hemen doktorunuza danışın. Tıbbi tedavi görmeniz gerekebilir.

Doz aşımı belirtileri:

Uyku hali, yorgunluk, enerjisizlik, bilinç kaybı, koma, zihin karışıklığı, halüsinasyonlar, ajitasyon, tutarsız konuşma, kollarda/bacaklarda tutulma, ellerin titremesi, nöbetler, tükürük salgısında artış, gözün siyah kısmının genişlemesi, bulanık görme, düşük tansiyon, dizlerin çözülmesi, hızlı veya düzensiz nabız, yüzeysel veya güç nefes alıp verme.

CLONEX'i kullanmayı unutursanız:

Bir dozu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer bir sonraki dozunuzun zamanı çok yaklaşmışsa, unutulmuş tabletleri atlayınız ve bir sonraki dozunuzu doğru zamanda alınız. 48

saatten fazla hiç CLONEX almadıysanız mümkün olan en kısa süre içerisinde doktorunuzla iletişime geçiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CLONEX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuza sormadan **CLONEX** kullanmayı bırakmayınız çünkü yoksunluk reaksiyonları yaşayabilirsiniz. Bu reaksiyonlar arasında terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal yer alır. **Sizde yukarıdaki belirtilerden herhangi biri varsa vakit geçirmeden doktorunuza söyleyiniz. Derhal tedavi edilmezseniz bu belirtileri daha ciddi yan etkiler takip edebilir.** Baştaki belirtileriniz tekrar ortaya çıkabilir. Tedaviyi durdurmanız gerekirse, bir ila iki haftada 12,5 mg'lık adımlarla dozda aşamalı azalma önerilir. Doktorunuz, günlük dozunuzu nasıl azaltacağınız konusunda size tavsiyede bulunacaktır. **CLONEX** tedavisini aniden bırakmanız gerekiyorsa doktorunuz tarafından kontrol edilmeniz gerekecektir.

Eğer doktorunuz **CLONEX** ile tedaviye tekrar başlamaya karar verirse ve son **CLONEX** dozunuz iki günden fazla bir süre önceyse, tedaviye 12,5 mg başlangıç dozu ile başlayacaksınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CLONEX'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

CLONEX'in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın	:10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın	:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan	:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek	:1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek	:10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen :Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CLONEX'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Soğuk algınlığı, ateş, grip benzeri belirtiler, boğaz ağrısı veya herhangi bir başka enfeksiyona ilişkin belirtiler gösterirseniz bu belirtilerin ilacınızla ilişkili olup olmadığını değerlendirmek üzere acil kan testi yaptırmanız gerekecektir.
- Acil tedavi gerektiren ciddi bir yan etki yaşıyor olabileceğinizden dolayı bilinç kaybına yol açabilecek vücut sıcaklığında ani hızlı artış, kaslarda katılık (nöroleptik malign sendrom) yaşarsanız.
- Ezici göğüs ağrısı, göğüs darlığı, basılması veya sıkışması hissi (göğüs ağrısı sol kol, çene, boyun ve üst karın bölgesine yayılabilir), nefes darlığı, terleme, güçsüzlük, baş dönmesi, bulantı, kusma ve çarpıntı (kalp krizi belirtileri) yaşarsanız. Derhal acil tıbbi tedavi görebileceğiniz bir yere gitmelisiniz.
- Dinlenirken bile hızlı ve düzensiz kalp atımı, çarpıntı, solunum problemleri, göğüs ağrısı veya açıklanamayan yorgunluk yaşıyorsanız. Doktorunuz kalbinizi kontrol edecek ve acilen bir kardiyoloğa görünmeniz gerekir gerekecektir.
- Göüste baskı, ağırlık, sıkışma, darlık, yanma veya boğulma hissi yaşarsanız (kalp kasına yetersiz kan akışı ve oksijen erişimi belirtileri). Doktorunuzun kalbinizi kontrol etmesi gerekecektir.
- Bulantı (kusma hissi), kusma ve/veya iştah kaybı yaşarsanız. Doktorunuzun karaciğerinizi kontrol etmesi gerekecektir.
- Şiddetli kabızlık yaşarsanız. Doktorunuzun ilave komplikasyonlardan (istenmeyen sorunlardan) kaçınmak üzere bunu tedavi etmesi gerekecektir.
- Ateş, öksürük, solunum güçlüğü, hırıltı gibi pnömoni veya solunum sistemi enfeksiyonu belirtileriniz varsa.
- Özellikle bacaklarda kan damarlarından akciğerlere ilerleyerek göğüs ağrısı veya solunum güçlüğüne yol açabilecek damarlarda kan pıhtıları belirtileriniz varsa (semptomlar bacakta

şişlik, ağrı ve kızarıklık içerir).

- Şiddetli terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma ve diyare yaşıyorsanız (kolinerjik sendrom semptomları).
- Şiddetli ölçüde azalmış idrar çıkışı yaşıyorsanız (böbrek yetmezliği belirtisi).
- Nöbetler yaşıyorsanız.
- Alerjik reaksiyon yaşarsanız (özellikle yüz, ağız, boğazın yanı sıra dilde kaşıntılı ya da ağrılı olabilen şişme),
- Erkekseniz ve kalıcı ağrılı penis ereksiyonu yaşıyorsanız. Bu durum priapizm olarak isimlendirilir.
- 4 saatten uzun süren bir ereksiyon yaşarsanız ilave komplikasyonlardan (istenmeyen sorunlardan) kaçınmak üzere derhal tıbbi tedaviye başvurun.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Diğer yan etkiler:

Çok yaygın:

- Sersemlik,
- Baş dönmesi,
- Hızlı kalp atımı,
- Kabızlık,
- Artmış salya üretimi.

Yaygın:

- Düşük beyaz kan hücresi düzeyi (lökeni),
- Yüksek beyaz kan hücresi düzeyi (lökositoz),
- Spesifik bir beyaz kan hücresinin yüksek düzeyi (eozinofili),
- Kilo artışı,

- Bulanık görme,
- Baş ağrısı,
- Titreme,
- Katılık,
- Huzursuzluk,
- Nöbetler,
- Titremeler,
- Anormal hareketler,
- Harekete başlayamama,
- Hareketsiz kalamama,
- EKG değişiklikleri,
- Yüksek kan basıncı,
- Pozisyon değiştirdikten sonra bayılma veya baş dönmesi,
- Ani bilinç kaybı,
- Bulantı (kusacak gibi hissetme),
- Kusma,
- İştah kaybı,
- Ağız kuruluğu,
- Karaciğer fonksiyon testlerinde minör anomaliler,
- Mesane kontrolü kaybı,
- İdrara çıkma güçlüğü,
- Yorgunluk,
- Ateş,
- Artmış terleme,
- Artmış vücut sıcaklığı,
- Konuşma bozuklukları (örn., geveleyerek konuşma).

Yaygın olmayan:

- Beyaz kan hücresi eksikliği (agranülositoz),
- Nöroleptik malign sendrom (yüksek ateş, bozulmuş bilinç durumu ve kas katılığı ile görülen

bir bozukluk),

- Konuşma bozuklukları (örn., kekeleme).

Seyrek:

- Düşük kırmızı kan hücreleri düzeyi (anemi),
- Huzursuzluk,
- Ajitasyon,
- Kafa karışıklığı,
- Hezeyan,
- Dolaşım sisteminin çökmesi,
- Düzensiz kalp atımı,
- Kalp kası (miyokardit) veya kalp kasını çevreleyen membranın (perikardit) enflamasyonu,
- Kalp etrafında sıvı tutulumu,
- Yutkunma güçlüğü (örn., yiyeceğin yanlış yerden gitmesi),
- Solunum yolu enfeksiyonu ve pnömoni,
- Kanda yüksek şeker düzeyi,
- Diyabet (şeker hastalığı),
- Akciğerlerde kan pıhtısı (tromboembolizm),
- Karaciğer enflamasyonu (hepatit),
- Derinin sararması/koyu idrar/kaşıntıya neden olan karaciğer hastalığı,
- Pankreasın şiddetli üst karın ağrısına yol açan enflamasyonu,
- Kreatinin fosfokinaz olarak adlandırılan enzimin kan düzeylerinde artış,
- Normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (uyku apnesi).

Çok seyrek:

- Kan damarlarında olası pıhtılaşma ile kan trombositleri sayısında artış,
- Kan trombositleri sayısında azalma,
- Kontrol edilemez ağız/dil ve uzuv hareketleri,
- Takıntılı düşünceler ve kompulsif tekrarlayan davranışlar (obsesif kompulsif semptomlar),
- Deri reaksiyonları,

- Kulağın önünde şişlik (tükürük bezlerinin büyümesi),
- Solunum güçlüğü,
- Kontrol edilemeyen kan şekereye bağlı komplikasyonlar (örn., koma veya ketoasidoz),
- Kanda çok yüksek trigliserit veya kolesterol düzeyleri,
- Kalp kası bozukluğu (kardiyomiyopati),
- Durmuş kalp atımı (kalp durması),
- Bağırsak tıkanıklığının neden olduğu karın ağrısı ve mide krampları ile şiddetli kabızlık (paralitik ileus),
- Karın şişliği,
- Karın ağrısı,
- Şiddetli karaciğer hasarı (fulminan hepatik nekroz),
- Böbrek iltihabı,
- Kalıcı ağrılı penis ereksiyonu (priapizm),
- Ani açıklanamayan ölüm.

Sıklığı bilinmeyen:

- Yağlı karaciğer hastalığı,
- Karaciğer hücrelerinin ölümü,
- Karaciğer toksisitesi/ yaralanmasını içeren karaciğer bozuklukları,
- Karaciğer yetmezliği (ölüme yol açabilir),
- Karaciğer hasarı (karaciğer hücreleri, karaciğerde safra kanalı veya her ikisinin hasarı) ve karaciğer nakli gibi yaşamı tehdit eder sonuçlara yol açan karaciğer olayları dahil karaciğer fonksiyonu kaybına yol açan normal karaciğer dokusunun yerini skar dokusunun aldığı karaciğer bozuklukları,
- Beyin dalgaları makinesinde değişiklikler (elektroensefalogram/EEG),
- Diyare,
- Mide rahatsızlığı,
- Mide yanması,
- Bir öğünden sonra mide rahatsızlığı,
- Kas güçsüzlüğü,

- Kas spazmları,
- Kas ağrısı,
- Burun tıkanıklığı,
- Gece yatağı ıslatma,
- Kan basıncında ani, kontrol edilemeyen artış (psödofeokromositom),
- Vücudun bir tarafa doğru kontrol edilemeyen eğilmesi (plörototonus),
- Erkekseniz semenin penisten çıkmak yerine mesaneye girdiği ejakülasyon bozukluğu (kuru orgazm veya geri ejakülasyon),
- Döküntü,
- Morumsu-kırmızı noktalar,
- Kan damarında enflamasyon nedeniyle ateş veya kaşıntı,
- Diyareye yol açan enflamasyon,
- Karın ağrısı,
- Ateş,
- Deri renginde değişiklik,
- “Kelebek” yüz döküntüsü,
- Eklem ağrısı,
- Kas ağrısı,
- Ateş ve yorgunluk (lupus eritematöz),
- Kanıtlanmış ya da yüksek düzeyde şüphelenilen enfeksiyon ile birlikte düşük vücut sıcaklığı,
- Anormal hızlı solunum,
- Hızlı kalp atışı,
- Tepki verme ile birlikte dikkatte azalma ve tansiyon düşüşü (sepsis),
- Göğüste aralıklı “vurma” “çarpma” veya “çarpınma” hissi (çarpıntı),
- Hızlı ve düzensiz kalp atışı (atriyal fibrilasyon).
- Bazı durumlarda çarpıntılar, bayılma, nefes darlığı veya göğüste rahatsızlık olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. CLONEX’in saklanması

CLONEX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CLONEX’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CLONEX’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi: GENTHON BV /Hollanda lisansı ile ;

ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

55020-İlkadım/SAMSUN

Üretici: ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

55020-İlkadım/SAMSUN

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.