

## KULLANMA TALİMATI

### CEFİTEN 400 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her bir film kaplı tablet 400 mg sefditorene eşdeğer 490,40 mg sefditoren pivoksil içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Mikrokristalin selüloz, sodyum kazeinat, kroskarmelloz sodyum, sodyum lauril sülfat, koloidal silikon dioksit, hidroksipropil metil selüloz, sodyum stearil fumarat, opadry II 85G18490 white [titanyum dioksit (E171), talk, lesitin (soya) (E322), polietilen glikol, polivinil alkol] içerir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

- 1. CEFİTEN nedir ve ne için kullanılır?***
- 2. CEFİTEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
- 3. CEFİTEN nasıl kullanılır?***
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?***
- 5. CEFİTEN'in saklanması***

**Başlıkları yer almaktadır.**

## **1. CEFITEN nedir ve ne için kullanılır?**

CEFITEN; sefalosporin grubu bakteriyel enfeksiyonlara (mikroorganizmalarla oluşan hastalıklar) karşı kullanılan bir üründür.

Her film kaplı tablet 400 mg sefditorene eşdeğer sefditoren pivoksil içerir. 10, 14, 20 ve 28 film kaplı tablet içeren Alu/Alu blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Tabletler beyaz renkli, oblong, bikonveks çentikli film kaplı tabletler şeklindedir.

CEFITEN, erişkinlerde ve ergenlerde (12 yaş ve üzeri), aşağıda belirtilen durumlarda, duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu, hafif ve orta dereceli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

- Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi
- Toplumdan kazanılmış pnömonilerin (zatürrenin) tedavisinde
- Farenjit (yutak iltihabı) / Tonsillit (bademcik iltihabı) / Sinüzit
- Deri ve yumuşak doku hastalıkları
- Üriner enfeksiyonlar: İdrar kesesi iltihabı (mesane iltihabı), idrar yolları ve böbrekte gelişen iltihap (piyelonefrit)

## **2. CEFITEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **CEFITEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.**

Eğer;

- Sefalosporin grubu antibiyotiklere veya bileşenlerinden birine alerjiniz var veya geçmişte olmuşsa, karnitin eksikliği veya klinik olarak anlamlı karnitin eksikliği ile sonuçlanabilen doğumsal metabolizma bozukluklarınız var veya geçmişte olmuşsa CEFITEN’i kesinlikle kullanmayınız.
- CEFITEN, bir süt proteini olan kazeinat içerir. Süt proteinine aşırı duyarlılığınız (laktoz tahammülsüzlüğü değil) var veya geçmişte olmuşsa CEFITEN’i uygulamayınız.
- CEFITEN lesitin (soya) (E322) ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

### **CEFITEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.**

Tüm sefalosporin ilaçlarında olduğu gibi, CEFITEN tedavisine başlamadan önce sizin önceden sefditoren pivoksil, diğer sefalosporinler, penisilinler veya diğer ilaçlara aşırı duyarlılık reaksiyonu gösterip göstermediğiniz dikkatlice araştırılmalıdır. Sefditoren pivoksile

karşı alerjik bir reaksiyon ortaya çıkarsa, ilacı kesiniz. Ağır, akut aşırı duyarlılık reaksiyonları tedaviyi gerektirebilir.

Sefditoren pivoksil dahil olmak üzere, bakterilerle gelişen hastalıklara karşı kullanılan hemen hemen tüm ilaçlarla, psödomembranoz kolit (yalancı zarlar içeren kalın barsak iltihabı) bildirilmiştir ve hafiften hayati tehdit edici şiddete kadar değişebilir. Dolayısıyla, bakterilerle gelişen hastalıklara karşı kullanılan ilaçların uygulamasını takiben ishal olan hastalarda bu tanının göz önünde bulundurulması önemlidir. CEFITEN kullanımı ile antibiyotik bağlantılı ishal, kalın barsak iltihabı ve karın ağrısı ile birlikte şiddetli, kanlı / kansız ishal bildirilmiştir. Eğer tedavi sırasında şiddetli ve/veya kanlı ishal gelişirse CEFITEN kesilmeli ve uygun tedavi başlanmalıdır.

Sefditoren önceden mide-barsak hastalığı, özellikle kalın barsak iltihabı öyküsü olan bireylerde dikkatli kullanılmalıdır.

Orta – şiddetli böbrek yetmezliği olan hastaların kanlarında kalan ilacın miktarı artmıştır. Bu nedenle nöbet gibi potansiyel klinik sonuçları önlemek için akut ya da kronik orta – şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda günlük toplam doz azaltılmalıdır.

Sefalosporin grubu antibiyotikler, eş zamanlı olarak aminoglikozid grubu antibiyotikler ya da güçlü diüretikler (örneğin furosemid) gibi böbrek üzerine zararlı etkileri olabilen ilaçları almakta olan kişilere dikkatle verilmelidir, çünkü bu ilaçların birlikte kullanılması durumunda böbrekler ve kulak üzerine zararlı etkileri olabilir.

CEFITEN veya pivoksil grubu antibiyotiklerin uygulanması, çocuklarda (özellikle bebekler ve küçük çocuklar) karnitin eksikliğine bağlı kan şekerinde düşmeye neden olabilir. Bu yüzden, pivoksil grubu içeren bir antibiyotik verildiğinde, karnitin eksikliği açısından hastalar dikkatle izlenmelidir.

Sefalosporinler, kanın pıhtılaşmasını azaltabilir. Böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalar, beslenme durumu kötü olanlar, uzun süreli antimikrobiyal (mikroorganizmalara karşı) tedavi alan hastalar ve pıhtılaşma önleyici tedavi ile dengede tutulan hastalar risk altındadır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

## **CEFİTEN'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

CEFİTEN yemeklerle birlikte alınmalıdır.

## **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Gebe kadınlarda CEFİTEN kullanılması nerilmez.

Hamileliđin son 3 aylık dneminde uzun dnem CEFİTEN veya pivoksil grubu ieren diđer antibiyotikleri kullanan kadınlarda ve bu řekilde dođan bebeklerde karnitin eksikliđi bildirilmiřtir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

## **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Emziren annelerin CEFİTEN kullanması nerilmez.

## **Ara ve makine kullanımı**

CEFİTEN bař dnmesi ve uyku haline sebep olabilir. Bu durumda, herhangi bir ara veya makine kullanım yeteneđi olumsuz olarak etkilenebilir.

## **CEFİTEN'in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

CEFİTEN lesitin [(soya) (E322)] ihtiva eder. Eđer fıstık veya soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi rn kullanmayınız.

## **Diđer ilalar ile birlikte kullanımı**

*Antiasidler ve H<sub>2</sub>-reseptr antagonistleri:* Peptik lser ilaları sefditoren'in emilimini azaltabilir.

*Probenesid:* Sefditoren'in kan dzeyini artırabilir.

*Oral kontraseptifler (dođum kontrol hapları):* Sefditoren pivoksilin birlikte alınmasının zararı yoktur.

*Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. CEFITEN nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

CEFITEN'i günde iki kez olacak şekilde yemeklerle birlikte alınız. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde tedavi süresi genel olarak 5-7 gündür.

Erişkinler ve Adolesanlar ( $\geq 12$  yaş):

- Farenjit (yutak iltihabı), tonsillit (bademcik iltihabı): 5-7 gün süreyle 12 saatte bir 200 mg sefditoren
- Sinüzit: 7-10 gün süreyle 12 saatte bir 200 mg sefditoren
- Kronik Bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi: 5 gün süreyle 12 saatte bir 200 mg sefditoren
- Toplumdan kazanılmış zatürre:
  - Hafif ve orta şiddetli olgularda: 10-14 gün süreyle 12 saatte bir 200 mg sefditoren
  - Ağır olgularda: 10-14 gün süreyle 12 saatte bir 1 tablet (400 mg sefditoren)
- Basit deri ve yumuşak doku iltihapları: 7-10 gün süreyle 12 saatte bir 200 mg sefditoren
- İdrar yolu enfeksiyonları:
  - Hafif ve orta şiddetli olgularda: 7-14 gün süreyle 12 saatte bir 200 mg sefditoren
  - Ağır olgularda: 7-14 gün süreyle 8 saatte bir 200 mg sefditoren

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

Tableti yeterli miktarda sıvı ile alınız (örneğin bir bardak su ile).

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

Sefditoren pivoksil tabletin 12 yaşın altındaki çocuk hastalarda etkinlik ve güvenilirliği saptanmamıştır.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

Sefditoren pivoksil 200 mg alan yaşlı ve genç hastalar arasında, etkinlik ve güvenilirlikte klinik olarak anlamlı farklılıklar gözlenmemiştir. Normal (yaşlarına göre) böbrek işlevi olan yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Bu ilacın önemli miktarda, böbrekten atıldığı bilinmektedir ve bu ilaca karşı olumsuz reaksiyon riski, böbrek işlev bozukluğu olan hastalarda daha fazla olabilir. Yaşlı hastaların böbrek işlevinde azalma olasılığı daha çok olduğundan, doz seçiminde dikkatli olunmalıdır ve böbrek işlevinin izlenmesi yararlı olabilir.

### **Özel kullanım durumları:**

#### **Böbrek yetmezliği:**

- Hafif böbrek bozukluğu olan hastalar için doz ayarlaması gerekmez.

Son dönem böbrek hastalığı olanlarda uygun doz belirlenmemiştir.

**Karaciğer yetmezliği:** Hafif veya orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

*Eğer CEFITEN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla CEFITEN kullandıysanız:**

İnsanda sefditoren pivoksilin doz aşımıyla ilgili bilgi yoktur. Ancak, diğer  $\beta$ -laktam antibiyotiklerle, doz aşımını takip eden istenmeyen etkiler bulantı, kusma, göbek üstündeki karın kısmında rahatsızlık, ishal ve kasımlı nöbetler olmuştur. Hemodiyaliz, sefditorenin vücuttan uzaklaştırılmasına, özellikle böbrek fonksiyonu kısıtlı olanlarda yardımcı olabilir. Doz aşımı belirtilere yönelik olarak tedavi edilir ve gerektiğinde destekleyici önlemler alınır.

*CEFITEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **CEFITEN'i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

#### **CEFITEN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

CEFITEN tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi CEFITEN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler ařađıdaki kategorilerde gsterildiđi řekilde tanımlanmıřtır:

ok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde grlebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla grlebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla grlebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az grlebilir.

ok seyrek: 10.000 hastanın birinden az grlebilir.

### **ok yaygın**

- İshal

### **Yaygın**

- Vajinal mantar
- Bař ađrısı
- Bulantı, karın ađrısı, hazımsızlık

### **Yaygın olmayan**

- Ateř, terleme, dřknlk, ađrı, gcszlk
- Mantar infeksiyonlarına bađlı kızarıklıklar, ađızda mantar hastalıđına bađlı ađrılı blgeler
- Bođaz, burun ya da sinslerde ađrı, iltihap
- Bař dnmesi
- Alerjik reaksiyon, yzde řiřme,
- rtiker (kurdeřen), kařıntı, dknt
- Sinirlilik, yarı uyku durumu, uykusuzluk, anormal ryalar
- Ayak bileklerinde řiřme
- Kusma, iřtahsızlık, ađız kuruluđu, gaz, geđirme, kabızlık, iřtah artıřı, tat bozukluđu, susama
- Vajinal enfeksiyon, vajinal akıntı
- Karaciđer fonksiyonlarında bozulma

### **Seyrek**

- Kanda trombosit sayısının azalması (bu nedenle kanama, morarma olabilir, lenf bezlerinde byme)
- Zihinsel iřlevlerde zayıflama, benlik yitimi, duygusal zayıflık, ařırı neřeli olma, sanrılar, dřnme bozuklukları, cinsel istekte artıř, unutkanlık, koordinasyon bozukluđu, kasın dinlenme anındaki kasılmasının artması, titreme, kulak ınlaması

- Bayılma, pozisyona bağı tansiyon düşüklüğü, kalp yetmezliği, kalp atımının hızlanması, kalp atım bozuklukları
- Görme bozukluğu, göz ağrısı, göz kapağı iltihabı
- Ağız iltihabı, ağız ülserleri, dil iltihabı, hıçkırma, renksiz dil, kanlı ya da kansız ishal, sıvı kaybı,
- Kalınbağırsak iltihabı. Antibiyotik tedavisi sırasında veya sonrasında başlayan:
  - İshal (kanlı ya da kansız)
  - Karında kramp ya da ağrı
- Akne, saç dökülmesi, egzema, soyulma tipinde deri iltihabı, uçuk, vücut kokusu, ışığa duyarlılık reaksiyonu
- Kas ağrısı
- İdrar yolu sistem iltihabı
- İdrar yaparken yanma, böbrek boşluğunda ağrı, böbrek iltihabı, gece idrara çıkma, çok miktarda idrar yapma, idrarını tutamama,
- Meme ağrısı, adet düzensizlikleri, adet dönemleri arasında kanama olması, iktidarsızlık
- Kan şekerinin yükselmesi,
- Kan potasyum seviyelerinin normalin altına düşmesi, kandaki protein miktarının düşmesi
- Ciltte ve göz akında sararma
- Menenjit (beyin zarı iltihabı)
- Hareket ederken ya da istirahat halinde nefes darlığı (astım), bacaklarda şişme
- Mide- barsak kanaması (dışkıdan kan gelmesi)

### **Bilinmiyor**

- Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, ürtiker (kurdeşen)
- Hızla gelişen böbrek yetmezliği
- Zatürre

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da



0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### **5. CEFITEN'in saklanması**

*CEFITEN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işık ve nemden koruyunuz.*

#### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEFITEN'i kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, CEFITEN'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

***Ruhsat Sahibi :*** Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.  
Esenler / İSTANBUL  
Tel : 0850 201 23 23  
Faks : 0212 482 24 78  
e-mail : bilgi@neutec.com.tr

***Üretim Yeri :*** Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.  
Arifiye / SAKARYA

*Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.*