

## KULLANMA TALİMATI

### DERMO-REST® %1 krem

Haricen kullanılır.

- **Etkin madde:** Her gramında 10 mg tiokonazol içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Emülsiyon vaksı, setil alkol, setostearil alkol, fraksiyonlanmış hindistan cevizi yağı, gliseril monostearat, sorbitol solüsyonu (E 420), likit parafin, benzil alkol, karbomer 940, sodyum lauril sülfat, sodyum hidroksit, saf su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz kullanmayınız.***

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **DERMO-REST nedir ve ne için kullanılır?**
2. **DERMO-REST'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **DERMO-REST nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **DERMO-REST'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. DERMOREST nedir ve ne için kullanılır?**

DERMO-REST deri kremidir, tiokonazol etkin maddesini içerir. 20 g'lık alüminyum tüplerde sunulmaktadır.

DERMO-REST, duyarlı mantarların sebep olduğu deri enfeksiyonlarının tedavisinde, bu arada bir mantar çeşidi olan Candida'ya bağlı ya da Candida ile komplike çocuk bezi pişiklerinin tedavisinde ve bunlara duyarlı gram-pozitif bakterilerin eklenmiş olduğu durumları tedavi etmek için kullanılır.

Ayaklarda görülen mantar enfeksiyonu (tinea pedis), gövde, kol, bacak ve kasıkların mantar enfeksiyonu (tinea kruris/ korporis), deri yüzeyi mantarı (tinea versicolor) ve tırnak mantarı (tinea unguium) gibi enfeksiyonlar DERMOREST tedavisine iyi cevap verirler.

### **2. DERMOREST'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

DERMO-REST göze uygulanmaz.

### **DERMO-REST'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer,

- Daha önce mantar hastalıklarının tedavisinde kullanılan imidazol grubu ilaçlara veya deri preparatlarındaki diğer yardımcı maddelere karşı aşırı hassasiyet göstermişseniz.

## **DERMO-REST'i ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eęer,

- DERMO-REST'i bir mantar eřidi olan Candida'ya baęlı ya da Candida ile tedavisi zorlařmıř ocuk bezi piřiklerinin tedavisinde kullanıyorsanız.  
Bu durumda, kesinlikle doktor nerisi ve dozaj ayarlaması gerekir.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

### **DERMO-REST'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

DERMO-REST krem haricen kullanılır. Yemeklerle etkileřim beklenmez.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Hamileyseniz ilacı kullanıp kullanmayacaęınıza doktorunuz karar verecektir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Bu ilacın anne st ile atılıp atılmadıęı bilinmemektedir. Birok ila anne stne getięinden, DERMO-REST uygulaması sırasında emzirmeye geici olarak ara vermelisiniz.

### **Ara ve makine kullanımı**

Bilinen bir etkisi yoktur.

### **DERMO-REST'in ierdięi bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler**

Bu tıbbi rn stearyl alkol ve setostearil alkol ierir. Lokal deri reaksiyonlarına (rneęin, temas dermatiti) neden olabilir.

### **Dięer ilalar ile birlikte kullanımı**

Dięer ilalar ile bilinen bir etkileřimi yoktur.

*Eęer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. DERMO-REST nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıęı iin talimatlar:**

DERMO-REST, sabah ve/veya akřam gnde bir veya iki defa, hastalıklı deri alanına ve bunun etrafına hafife masaj yapar gibi srlmelidir.

7 gnlk tedavi deri yzeyi mantarı (tinea versikolor) olan hastaların byk bir kısmında yeterlidir, fakat řiddetli ayak mantarında (tinea pedis), zellikle mzmin nasır (kronik hiperkeratotik) tiplerinde 6 haftaya kadar sren tedavi gerekebilir.

Diğer bölgelerdeki mantar enfeksiyonlarında, bir tür mantar hastalığı olan kandidiyazis ve eritrazmada gereken tedavi süresi genellikle 2-4 haftadır.

Enfeksiyona neden alan organizmanın cinsine ve enfeksiyonun yerine bağlı olarak iyileşme için gerekli tedavi süresi hastadan hastaya değişir.

**Uygulama yolu ve metodu:**

Lokal (topikal) olarak uygulanır.

DERMO-REST, sabah ve/veya akşam günde bir veya iki defa, hastalıklı deri alanına ve bunun etrafına hafifçe masaj yapılarak sürülmelidir. Pişikli bölgelerde ıslanarak yumuşamayı önlemek için krem az miktarda ve iyice yedirilerek sürülmelidir.

**Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:**

Çocuklarda kullanımına yönelik yapılmış klinik çalışma mevcut değildir.

**Yaşlılarda kullanımı:**

Mevcut değildir.

**Özel kullanım durumları:**

**Böbrek ve karaciğer yetmezliği**

Mevcut değildir.

*Eğer DERMO-REST'in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla DERMO-REST kullandıysanız:**

*DERMO-REST'den kullanmanız gerekenden fazla kullanırsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**DERMO-REST'i kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**DERMO-REST ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Doktorunuz size aksini söylemedikçe, DERMO-REST kullanmaya devam ediniz.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, DERMO-REST'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

DERMO-REST haricen uygulandığında sistemik yan etki beklenmez. Bazı hastalarca uygulama yerinde yanma belirtileri bildirilmiştir. Bunlar genellikle tedavinin ilk haftasında görülür, hafif ve geçicidirler.

Ancak DERMO-REST kullanımı ile duyarlılık reaksiyonu meydana gelirse, tedavi kesilmeli ve uygun terapi tatbik edilmelidir. Çok uzun kullanıldığında sistemik toksik etkiler görülebilir.

Yan etkiler ařağıdaki kategorilerde gösterildiğı gibi sıralanmıřtır:

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

### **Yaygın**

- Yumuřak deri alanlarında řiřme

### **Yaygın olmayan**

- Bir tür deri hastalığı (dermatit)
- Döküntü

Bu yan etkileri genelde tedavinin ilk haftasında oluşur ve kısa süreli ve hafif düzeyde olma eğilimi gösterir.

### **Bilinmeyen:**

- Ciltte veya yüzde kařıntı, řiřme veya kabarcıklar şeklinde ortaya çıkabilen alerjik reaksiyon
- Uyuřma
- Sıvı dolu kabarcıklarla beliren deri döküntüsü (büllöz erüpsiyon)
- Temasla ortaya çıkan deri hastalığı (temas dermatiti)
- Cilt kuruluđu
- Tırnak bozuklukları (renk değıřikliği, tırnak çevresinde iltihap ve tırnakta ağrı dahil)
- Deride pullanma
- Deride yanma hissi
- Kurdeřen
- Ağrı

*Eđer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karřılařırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

### **Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemřireniz ile konuşunuz. Ayrıca karřılařtığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduđunuz ilacın güvenliliğı hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sađlamıř olacaksınız.

### **5. DERMO-REST'in saklanması**

*DERMO-REST'i çocukların göremeyeceğı, erişemeyeceğı yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DERMO-REST'i kullanmayınız.*

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

**Ruhsat sahibi:** Avixa İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Başakşehir/İstanbul

**Üretim yeri:** Sanofi İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Lüleburgaz/Kırklareli

*Bu kullanma talimatı 30/09/2021 tarihinde onaylanmıştır.*