

KULLANMA TALİMATI

CLINDOXYL %5+%1 Jel Cilt üzerine uygulanır.

Etkin maddeler: 1 gram jel % 1 a/a (10 mg/g) klindamisine eşdeğer % 1,28 a/a klindamisin fosfat, %5 a/a (50 mg/g) susuz benzoil peroksit'e eşdeğer % 6,67 a/a sulu formda benzoil peroksit içerir.

Yardımcı maddeler: Karbomer, dimetikon, disodyum lauril sülfosüksinat, disodyum EDTA, gliserol, koloidal sulu formda silika, poloksamer 182, sodyum hidroksit, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. **CLINDOXYL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **CLINDOXYL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **CLINDOXYL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **CLINDOXYL'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. CLINDOXYL nedir ve ne için kullanılır?

CLINDOXYL, klindamisin ve benzoil peroksit içermektedir ve anti-akne preparatları olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir.

Klindamisin, aknedeki bakterilere karşı etkinliği olan bir antibiyotiktir. Benzoil peroksit komedonların (siyah nokta ve beyaz nokta) azaltılmasında etkilidir. Aynı zamanda aknedeki bakterileri öldürücü etkiye de sahiptir ve cildi daha az yağlı yapar.

CLINDOXYL hafif ila orta düzeydeki akne tedavisinde kullanılıp, aşağıda belirtilen hususlarda yardımcı olur:

- Aknelere sebep olan bakterilerin azaltılması
- Kırmızı, iltihaplı akne sayısının azaltılması
- Siyah nokta, beyaz nokta ve akneli bölgelerin tedavisi

CLINDOXYL, rengi, beyazdan hafif sarıya kadar değişen homojen jel formunda olup, 25 ve 50 g'lık tüplerde bulunmaktadır.

CLINDOXYL, 12 yaş üstü ergen ve yetişkinlerin kullanımına uygundur.

2. CLINDOXYL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLINDOXYL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- İlacın formülasyonunda bulunan etkin (klindamisin ve benzoil peroksit), yardımcı maddelerden herhangi birine (bu kullanma talimatının başında listelenmektedir) ve/veya linkomisine karşı alerjiniz var ise.
- Bir bağırsak hastalığı olan bölgesel enterit (Crohn's hastalığı), ülseratif kolit (kalın bağırsak hastalığı) veya bir antibiyotığın neden olduğu kolit geçiriyorsanız veya geçmişte bunları geçirmiş iseniz, CLINDOXYL'i kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

CLINDOXYL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- CLINDOXYL'i göz, dudak, ağız, diğer mukoz membranlara ve cildinizdeki kesik, yara, güneş yanığı ve egzama gibi tahriş olmuş alanlara uygulamayınız.
- CLINDOXYL cildinizi güneşin zararlı etkilerine karşı hassaslaştırabilir. Kullanım esnasında ultraviyole lambası kullanılmamalı ve güneş ışığına maruz kalma süresi minimumda tutulmalıdır. Güneş ışığına maruziyet önlenemediğinde, güneş koruyucu ürünler ve koruyucu giysiler kullanılmalıdır. Tedavinin ilk haftalarında hastaların çoğunda soyulma ve kızarıklıkta artış ortaya çıkmaktadır. Cildin tahriş olması durumunda, yağsız bir nemlendirici kullanabilir, uygulama sıklığını geçici olarak azaltabilir ya da kesebilirsiniz ve tedaviye yeniden başlayabilirsiniz.
- Ciltteki tahriş ciddileşirse (şiddetli kızarıklık, kuruluk, kaşıntı, batma veya yanma) veya geçmezse tedaviyi bırakınız ve doktorunuza danışınız.
- Birlikte kullanıldığında, tahriş edici bir etki ortaya çıkabileceğinden, topikal antibiyotikleri, tedavi edici veya cilt soyma (peeling) özelliği olan sabun ve temizleyiciler, güçlü kurutucu etkisi olan sabun ve kozmetikler, yüksek konsantrasyonda alkol ve/veya astrenjan (doku sıkılaştırıcı ilaçlar) içeren ürünler ile dikkatli kullanınız.
- CLINDOXYL yanıklıkla kesik ya da yaralı cilt bölgesine, gözünüze, ağızınıza, dudaklarınıza veya burnunuzun içine kaçarsa hemen bol su ile yıkayınız.
- CLINDOXYL renkli kumaştan yapılmış kıyafet, havlu ve yatak çarşaflarının rengini açabilir, saçları beyazlatabilir.
- Tedavi sonrası birkaç hafta içinde uzun süreli veya **şiddetli ishal** veya **karın bölgesinde kramp** ortaya çıkarsa **uygulamayı durdurunuz ve doktorunuza bildiriniz**. Fakat antibiyotiklerin bu etkileri daha çok sistemik kullanımda ortaya çıkmaktadır ve CLINDOXYL cilde uygulandığından böyle bir durumun ortaya çıkması beklenmez.
- Yakın zamanda başka klindamisin veya eritromisin içeren ilaçlar kullanmışsanız CLINDOXYL'in istendiği etkiyi gösterememe ihtimali daha yüksektir. Yakın zamanda klindamisin veya eritromisin içeren ilaçlar kullanıldıysa doktorunuza bildiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CLINDOXYL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CLINDOXYL'in yiyecek ve içecekler ile bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CLINDOXYL'in hamilelik sırasında kullanımı ile ilgili sınırlı bilgi bulunmaktadır. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız CLINDOXYL'i kullanmadan önce

doktorunuza danıřınız. Doktorunuz hamilelik doneminde CLINDOXYL kullanımının size olan yararını ve bebeđinize olan riskini deđerlendirecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan once doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

CLINDOXYL'in uygulamayı takiben anne sutune gecip gecmediđi bilinmemektedir.

CLINDOXYL'in etkin maddelerinden biri olan klindamisinin ađız veya enjeksiyon yoluya uygulanması sonucunda anne sutune geme ihtimali olduđu bilinmektedir. Eđer emziriyorsanız CLINDOXYL kullanmadan once doktorunuza danıřınız.

Emziriyorsanız, meme bolgesine CLINDOXYL'i uygulamayınız.

Ara ve makine kullanımı

CLINDOXYL'in ara ve makine kullanımına etkisi yoktur.

CLINDOXYL'in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında onemli bilgiler

Uyarı gerektiren yardımcı madde iermemektedir.

Diđer ilalar ile birlikte kullanımı

Herhangi bir ila kullanıyorsanız, yakın zamanda kullanmıřsanız veya kullanma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza soyleyiniz.

Ařađıda belirtilen urunleri kullanıyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza soyleyiniz:

- Antibiyotikler dahil olmak uzere, herhangi bir akne tedavisi,
 - İlalı veya 'ařındırıcı' sabunlar ve temizleyiciler,
 - Gulu kurutucu etkiye sahip sabunlar veya kozmetik urunler,
 - Yuksek miktarlarda alkol ieren veya 'damarları buzucu etkisi' olan urunler.
- unku bu urunler CLINDOXYL ile birlikte kullanıldıđında, cildinizi tahriř edebilir.

CLINDOXYL aynı anda kullanıldıđında bazı akne ilalarının etkisini azaltabilir: CLINDOXYL'i tretinoin, izotretinoin ya da tazaroten ieren bolgesel akne ilaları ile aynı anda kullanmayınız.

Ayrıca bu ilalardan birini kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza soyleyiniz. İki urunu gunun farklı saatlerinde kullanmanız gerekebilir (orneđin birini sabahları, diđerini akřamları). CLINDOXYL ile aynı zamanda diđer akne ilalarının kullanılması deri tahriři riskini artırabilir.

- Deri tahriři ciddileřirse (řiddetli kızarıklık, kuruluk, kařıntı, batma veya yanma) tedaviyi bırakın ve doktorunuza danıřın.
- CLINDOXYL eritromisin ieren ilalarla aynı zamanda kullanılmamalıdır.
- CLINDOXYL'in dapson ve sulfasetamid gibi ilalarla aynı zamanda kullanılması deri veya yuz kıllarının rengine deđici bir deđiřikliđe neden olabilir (sarı/turuncu renk). Bu durum kalıcı deđildir.
- CLINDOXYL'deki ilalardan biri bazı genel anestezi ilalarının ("norumuskuler bloker ajanlar" olarak adlandırılan) alıřma řeklini etkileyebilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. CLINDOXYL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuzun veya eczacınızın belirttiği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Günde bir kez akşamları cilt ılık su ile yıkayıp, tamamiyle temizlendikten ve kurulandıktan sonra, akneli bölgelere yaygın olarak ince bir tabaka halinde uygulayınız. Jeli uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

Eğer jel cildiniz tarafından emilmiyorsa çok fazla kullanıyor olabilirsiniz.

CLINDOXYL günde 1 kez akşamları uygulanmalıdır.

CLINDOXYL'in etkisini görmeniz 2 ila 5 hafta sürebilir.

Her seferinde 12 haftadan uzun süre kullanmayın. Doktorunuz tedavinizin ne kadar süreceğini size söyleyecektir.

- CLINDOXYL ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.
- Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü bu durumda tam etkisini gösteremez.
- Eğer cildinizde aşırı kuruluk ya da soyulma görülüyorsa yağsız bir nemlendirici kullanınız ya da CLINDOXYL'in kullanım sıklığını azaltabilir veya kullanımına kısa süreliğine ara verebilirsiniz. CLINDOXYL her gün kullanılmadığı sürece etkisini göstermeyebilir.
- CLINDOXYL kuruduktan sonra cildi yağlandırmayan bir makyaj yapılabilir.

Eğer CLINDOXYL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Uygulama yolu ve metodu:

CLINDOXYL'i parmak ucunuzla cilt üzerine uygulayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: 12 yaşın altındaki çocuklarda etkinlik ve güvenilirliği incelenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı: Yaşlılar için özel kullanım önerisi yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Özel kullanımı yoktur.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CLINDOXYL kullandıysanız:

CLINDOXYL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla kullanmamaya özen gösteriniz. CLINDOXYL'in gerekenden çok daha fazla kullanımı iyileşmeyi çabuklaştırmayacaktır. Bu durum ciltte

tahrişe sebebiyet verebilir. Böyle bir durumda ilacın kullanım sıklığı azaltılmalı veya birkaç gün ara verilmelidir.

Eğer CLINDOXYL'i yanlışlıkla yutarsanız, doktorunuza danışınız. Ağız yoluyla alınan antibiyotiklerle görülen benzer belirtiler sizde görülebilir (mide rahatsızlığı).

CLINDOXYL'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için iki defa üst üste uygulamayınız. Bir sonraki uygulamayı normal zamanında yapınız. Doktorunuza danışmadan CLINDOXYL'i 12 haftadan uzun süre kullanmayınız. Doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız.

CLINDOXYL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Tedaviyi doktorunuzun tavsiye ettiğinden daha erken sonlandırmanız durumunda akne oluşumu tekrarlayabilir. Bu nedenle doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, CLINDOXYL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa CLINDOXYL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Kaşıntılı ve ilerleyen döküntü, nefes almayı zorlayan yüzde ve ağızda şişlik, nefes tıkanıklığı gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları,
- Şiddetli ve uzun süreli ishal ya da karın ağrısı,
- Şiddetli yanma, soyulma veya kaşıntı.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise CLINDOXYL'e karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Çok yaygın:	10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın:	10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan:	100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek:	1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek:	10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor:	Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın

- Deride kızarıklık (özellikle kullanımın ilk birkaç haftası), soyulma, kuruluk.

Bu etkiler genellikle hafif düzeydedir.

Yaygın

- Deride yanma hissi,
- Uygulama bölgesindeki ciltte ağrı,
- Baş ağrısı,
- Güneşe hassasiyet.

Yaygın

- Karıncalanma (*parestezi*),
- Kızamık, kaşıntılı deri döküntüsü (*dermatit, eritematöz döküntü*),
- Kaşıntı,
- Akne durumunun kötüleşmesi.

Bilinmiyor

Çok az sayıda kişide görülen ancak sıklığı bilinmeyen diğer yan etkiler:

- Alerjik reaksiyonlar,
- Kanlı ishal ve karın ağrısı dahil, bağırsak inflamasyonu, ishal
- Uygulama bölgesinde kaşıntılı döküntü (ürtiker),
- Uygulama bölgesinde renk değişikliği dahil deri reaksiyonları.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. CLINDOXYL’in saklanması

CLINDOXYL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Eczanede: 2°C-8°C arasındaki sıcaklıklarda (buzdolabında) saklanmalıdır. Dondurmayınız.

Hasta ilacı satın aldıktan sonra: 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi geçmemiş olsa dahi, ilacı satın aldıktan 2 ay sonra atınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CLINDOXYL’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CLINDOXYL’i kullanmayınız. Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş., 1. Levent Plaza Büyükdere Cad. No: 173 B Blok 34394 1.Levent / İSTANBUL

Üretim yeri:

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş. Kapaklı, Tekirdağ

Bu kullanma talimatı..../..../.... tarihinde onaylanmıştır.