

KULLANMA TALİMATI

ANJIOFLUX 600 LRU/ 2 ml Enjektabl çözelti içeren ampul

İntramüsküler veya intravenöz kullanım için.

- **Etkin Madde:** Her bir 2 ml'lik ampul 600 LRU Glukuronilglukozaminoglikan sülfat (Sulodeksit) içerir.
- **Yardımcı Maddeler:** Her bir 2 ml'lik ampul sodyum klorür ve enjeksiyonluk su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz kullanmayınız.***

Bu kullanma talimatında:

1. **ANJIOFLUX Nedir ve Ne İçin Kullanılır?**
2. **ANJIOFLUX'u Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler**
3. **ANJIOFLUX Nasıl Kullanılır?**
4. **Olası Yan Etkiler Nelerdir?**
5. **ANJIOFLUX'un Saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. ANJIOFLUX Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

ANJIOFLUX Ampul;

- Kanın pıhtılaşmasını önleyen antitrombotik/heparin benzeri (kanı sulandıran) ilaçlar grubuna dâhil olan Sulodeksit isimli aktif maddeyi içerir.
- Her bir ampul 2 ml hacimde olup 600 LRU Sulodeksit içermektedir. Bir kutuda içerisinde açık sarı renkli şeffaf çözelti bulunan 10 adet ampul bulunmaktadır.

ANJIOFLUX Ampul ařađıdaki durumlarda kullanılır:

- Kronik toplardamar ülseri,
- Kalp krizi sonrası da dahil olmak üzere; damarlarda pıhtı oluřma riski yüksek olan, damar hastalıklarının tedavisinde,
- Beyni besleyen atardamar tıkanıklıklarında ve sertleřmelerinde, řeker hastalıđı, yüksek kan basıncı, kalp ađrısı ve çarpıntı, bař ađrısı, bař dönmesi, görme bozukluđu, ayak ve baldırlarda ödem, yürürken nefes darlıđı, ellerde ve ayaklarda morarmalara neden olan kalp damar sistemi hastalıđı ve beyin kan damarlarında oluřan tıkanmalara bađlı bunama belirtilerinin tedavisinde,
- řeker hastalıđı veya atardamar sertleřmesine bađlı damar tıkanıklıklarının tedavisinde,
- Toplardamar hastalıđı, toplardamarlarda pıhtı oluřumunun önlenmesinde ve tedavisinde,
- Küçük kan damarı hastalıklarının [böbrek hastalıđı, sinirsel hastalıklar, göze ait, dolařım bozuklukları- örneđin retinopati gibi,] ve řeker hastalıđına bađlı büyük kan damarı hastalıklarının [diyabetik ayak sendromu, beyin dokusunda bozulma ile belirgin beyin hastalıđı, kalp hastalıđı gibi] tedavisinde,
- Pıhtı oluřumuna sebep olan durumlarda ve bađıřıklık sisteminden kaynaklı (anti fosfolipid sendromu) hastalıđın tedavisinde kullanılır. Asetilsalisilik asit (Aspirin) ve düşük moleküler heparin (kan pıhtılařmasını önleyici ilaç) uygulamasından hemen sonra verilmelidir.

2. ANJIOFLUX'u Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

ANJIOFLUX'u ařađıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eđer,

- ANJIOFLUX'un içerdiđi etkin madde veya yardımcı maddelerden herhangi birisine karřı aşırı duyarlı iseniz,
- Kan sulandırıcı heparin ve heparin benzeri ilaçlara karřı aşırı hassasiyet gösteriyorsanız,
- Dođuřtan gelen ve kendiliđinden oluřan, kanama, pıhtılařma bozukluđu gibi belirgin kalıtsal hastalıđınız varsa, ANJIOFLUX kullanmayınız.

ANJIOFLUX'u ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Tedaviniz kan pıhtılařmasını önleyici veya geciktirici (antikoagülanlar) ile birlikte uygulanıyor ise periyodik olarak kanın pıhtılařma testlerinin yapılması gerekmektedir. Tedavi sırasında pıhtılařma testleriniz devamlı doktorunuz tarafından takip edilecektir. İlacın dođru olarak uygulanma yoluna iliřkin talimatlar için doktorunuza danıřınız.

ANJIOFLUX'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

ANJIOFLUX Ampul'ün kullanılmasında yiyecek ve içecek etkisine dair herhangi bir veri bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ANJIOFLUX Ampul gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

ANJIOFLUX'un insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

Bu nedenle, eğer emziriyorsanız mutlaka doktorunuza danışınız.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı:

ANJIOFLUX araç ve makine kullanımını etkilemez.

ANJIOFLUX'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:

Bu tıbbi ürün her ampulde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasen "sodyum içermez".

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:

Tedaviniz kan pıhtılaşmasını önleyici veya geciktirici (antikoagülanlar) ile birlikte uygulanıyor ise ilgili testlerinizin kontrol edilmesi gerekmektedir. ANJIOFLUX bu maddelerin pıhtılaşmayı önleyici etkilerini artırabilir.

Vitamin K, B kompleks vitaminleri, hidrokortizon (alerjik rahatsızlıkların, cilt hastalıklarının, romatizma, deri veremi, sedef hastalığı ve solunum bozukluklarının tedavisinde kullanılan ve vücutta doğal olarak oluşan hormonunun sentetik versiyonu), hyaluronidaz (enjekte edilen diğer ilaçların emilimini arttıran ilaç), kalsiyum glukonat (kalsiyum eksikliğini tedavi etmek için ya da önleyici ilaç), kuaterner amonyum tuzları (herhangi bir tıbbi müdahale öncesi enfeksiyonu önlemek amacı ile kullanılan mikrop karşıtı maddeler, antiseptikler), kloramfenikol, tetrasiklin ve streptomisin gibi bazı antibiyotik maddelerinden herhangi birini kullanıyor iseniz ANJIOFLUX kullanmayınız.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. ANJIOFLUX Nasıl Kullanılır?**Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Günde bir defa ANJIOFLUX Ampul uygulanır.

Tedaviye ampuller ile başlanması, ampuller ile 15–20 gün devam edildikten sonra kapsüller ile 30–40 gün devam edilmesi önerilir. Tam tedavi edici döngü yılda en az iki defa tekrarlanmalıdır. Doktorun görüşüne göre dozun miktarı ve sıklığı değişebilir.

Doktorunuz hastalığınıza bağılı olarak ilacınızın dozunu ve ne kadar kullanacağını size bildirecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

Kas içine veya damar içine enjekte edilir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda etkinlik ve güvenliliği tespit edilmemiştir, bu nedenle kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Özel kullanımı yoktur.

Eğer ANJIOFLUX'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ANJIOFLUX kullanırsanız:

Aşırı doz ile gözlenen tek yan etki kanamadır. Kanama durumunda protamin sülfat kullanılır.

ANJIOFLUX'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ANJIOFLUX'u kullanmayı unuttuysanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ANJIOFLUX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz tedavinizi ne zaman sonlandıracağını size söyleyecektir.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ANJIOFLUX'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ANJIOFLUX'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Aşırı duyarlılık reaksiyonları (yüzde, dilde ve soluk borusunda nefes almayı zorlaştırabilecek şişlik gibi)
- Ürtiker (kurdeşen)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ANJIOFLUX'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Uygulama bölgesinde ağrı, yanma
- Uygulama bölgesinde kan pıhtılaşması ve birikmesi

Bunlar ANJIOFLUX'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. ANJIOFLUX'un saklanması

ANJIOFLUX'u, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

ANJIOFLUX'u 25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında, ışıktan ve nemden koruyarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ANJIOFLUX'u kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız ANJIOFLUX'u şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat Sahibi Bio-Gen İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Adresi Bosna Hersek Cad. No: 33/2
06510 Emek - ANKARA

Üretim Yeri Mitim s.r.l.
Adresi Via Rodi 27 – 25124 Brescia (İTALYA)

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.