

KULLANMA TALİMATI

RESECTISOL® ÜROLOJİK İRİGASYON İÇİN %5 MANNİTOL SOLÜSYONU

Etkin maddeler: Her bir litre çözelti 5 gram mannitol içerir.

Yardımcı maddeler: Steril enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz** kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **RESECTISOL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **RESECTISOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **RESECTISOL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **RESECTISOL'ün saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. RESECTISOL nedir ve ne için kullanılır?

RESECTISOL, idrar kesesi (mesane) ve idrar yollarının yıkanma ve temizlenmesinde kullanılan mikropsuz bir çözeltilidir.

Üç litrelik plastik torbalarda sunulmuştur.

Erkeklerdeki prostat adı verilen bir salgı bezinin idrar yollarından girilerek gerçekleştirilen ameliyatlarında (transüretral prostat rezeksiyonu; TUR) bol miktarda kullanılan sıvının zararlı etkilerini önlemek amacıyla, su yerine yıkama çözeltisi olarak tercih edilir. Ayrıca mesane içine idrar yollarından uygulanan konsantre formda bulunan bazı ilaçları seyreltmek amacıyla da kullanılabilir.

İdrar yollarına uygulanan bir sonda aracılığıyla kullanılır; kesinlikle **damar içi yoldan uygulanmaz.**

2. RESECTISOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RESECTISOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Daha önce RESECTISOL'ün içerdiği etkin madde ya da yardımcı maddeleri içeren ilaçları aldığınızda alerjik bir tepki gösterdiyseniz, yani sizde aniden soluk kesilmesi, hırıltılı solunum, deri döküntüleri, kaşıntı ya da vücudunuzda şişme gibi belirtiler oluştuysa bu ilacı KULLANMAYINIZ.

Alerjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

Ayrıca eğer sizde,

- Akciğerlerinizde su toplanmasına (akciğer ödemi) bağlı soluk kesilmesi gibi belirtiler varsa;

Ya da bu ilaç uygulanmaya başlandıktan sonra,

- Böbreklerinizde ilerleyici bir hasar veya işlev bozukluğu olursa,
- kalbiniz ilerleyici bir şekilde yetmezliğe girerse,
- akciğerlerinizde su toplanmaya başlarsa

bu ilacı KULLANMAYINIZ

RESECTISOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

- Bu ilacın torbası sağlam değilse;
- İçindeki çözelti berrak değilse;
- Bu ilaç sizde idrar yollarınızdan girilerek yapılan bir ameliyatta kullanılacaksa (kullanılan sıvı kan dolaşımınıza geçebileceğinden) dikkatle kullanılmalıdır.

RESECTISOL'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Bu ilaç gebelik döneminde size ancak kesin gerekliyse uygulanacaktır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

RESECTISOL emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makine kullanımı

RESECTISOL'ün araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

RESECTISOL'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

RESECTISOL'ün içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız

yoksa, bu maddelere baęlı olumsuz bir etki beklenmez.

Dięer ilalar ile birlikte kullanımı

Reetesiz alınan ilalar, aşılar ve bitkisel ilalar da dahil olmak üzere bařka herhangi bir ila almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildirin.

RESECTISOL, seyreltilerek idrar yollarınızdan mesanenize uygulanan bazı ilalarla geimsiz olabilir. Uygulamayı yapacak doktor ya da saęlık görevlisi geimsiz olduęu bilinen bu ilaları özeltiye eklemeyecek ve bu ilaların seyreltilmesi için bařka özeltileri tercih edecektir.

Ayrıca sodyum ve potasyum tuzları eklenirse, özelti içindeki mannitol ökebilir.

özeltiye eklenecek herhangi bařka bir ilala olabilecek bir geimsizlik riskini en aza indirmek için, karıřtırma işleminden hemen sonra, uygulamadan önce ve uygulama sırasında belirli aralarla uygulaması yapılacak son karıřımda herhangi bir bulanıklık veya ökelleme olup olmadıęı saęlık görevlisi tarafından kontrol edilecektir.

Eęer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. RESECTISOL nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıęı için talimatlar:

Sizin bu ilaca hangi miktarlarda ihtiyacınız olduęuna, size ne zaman uygulanacaęına ve tedavinizin ne kadar süreceęine doktorunuz karar verecektir.

• Uygulama yolu ve metodu:

Temizlenmesi ya da yıkanması gereken bölgeye özel bir boruya (sonda) baęlı bir uygulama seti aracılıęıyla kullanılabilir. Bu durumda kullanılan setin kullanım talimatına uyulmalıdır.

Dikkat: Ürün damarii yoldan kullanılmaz.

Deęişik yař grupları

Çocuklarda kullanım:

Çocuklar için, doz ve uygulama sıklıęına uygulamayı öneren doktor tarafından karar verilir.

Yařlılarda kullanım:

Genel olarak yařlılarda karacięer, böbrek ya da kalp işlevlerinde azalmanın ve birlikte bařka ila kullanımının daha sık olduęu düşünülerek doz seiminde dikkatli davranılmalıdır.

Özel kullanım durumları:

Özel kullanım durumu yoktur.

Eęer RESECTISOL'ün etkisinin ok güçlü veya zayıf olduęuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla RESECTISOL kullandıysanız:

RESECTISOL'ü kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

RESECTISOL'ü kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

RESECTISOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, RESECTISOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir.

RESECTISOL'un içeriğinde bulunan mannitolün damar içi uygulanması sonucu ara sıra istenmeyen etkiler bildirilmiş olup bunların ne sıklıkta görüldüğü kesin olarak bilinmemektedir. Aşağıda bu yan etkiler sıralanmıştır:

- Vücuttaki sıvıların içinde erimiş halde bulunan iyonların miktarında azalma
- Vücut sıvılarının asitlik derecesinin artması
- İdrara çıkışta artış ya da idrara çıkamama
- Vücutta, kol ya da bacaklarda su toplanması (ödem)
- Sık nefes alıp verme, soluk alıp vermede zorlaşma, yatarken ya da merdiven çıkarken nefes alıp vermede zorlanma (kalp veya akciğer yetmezliği belirtileri)
- Ağızda kuruma, susama ve susuz kalma
- Kalpte çarpıntı
- Göğüs ağrısı
- Tansiyonda düşme
- Mesane, idrar yolları iltihaplanma ve diğer organlarda iltihaplanmalar
- Damar içi iltihaplı pıhtı oluşumu
- Görmede bulanıklık, havaleler, bulantı, kusma, burun akıntısı, titreme, baş dönmesi, sırt ağrısı ve kurdeşen gibi genel bozukluklar.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. RESECTISOL'ün saklanması

RESECTISOL'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altı sıcaklıkta saklayınız. Dondurmayınız.

Her bir torba etiketinde son kullanma tarihi yazmaktadır. Bu tarih geçmişse size bu ilaç verilmeyecektir. **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra RESECTISOL'ü kullanmayınız.

Ruhsat sahibi ve üretici: Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Cendere Yolu, Pırnal Keçeli Bahçesi
34390 Ayazağa-İSTANBUL

Tel: (0212) 329 62 00 Faks: (0212) 289 02 61

Bu kullanma talimatı ----- tarihinde onaylanmıştır.