

KULLANMA TALİMATI

RİFETEM® 250 mg + 10 mg/3 ml enjeksiyonluk çözelti

Kas içine uygulanır

Steril

• **Etkin madde:**

| | |
|----------------------|---|
| Rifamisin SV | 250 mg (257,95 mg Rifamisin SV sodyum olarak) |
| Lidokain hidroklorür | 10 mg |

• **Yardımcı maddeler:** Askorbik asit, disodyum EDTA, polivinilprolidon K17, sodyum bikarbonat, potasyum metabisülfid (E224), enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz kullanmayınız.***

Bu Kullanma Talimatında:

1. ***RİFETEM nedir ve ne için kullanılır?***
2. ***RİFETEM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
3. ***RİFETEM nasıl kullanılır?***
4. ***Olası yan etkiler nelerdir?***
5. ***RİFETEM'in saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1.RİFETEM nedir ve ne için kullanılır?

RİFETEM, 250 mg rifamisin SV (sodyum tuzu) ve 10 mg lidokain HCl etkin maddelerini içerir. 3 ml'lik bir ampul içinde ambalajlanmıştır.

RİFETEM, rifamisin grubundan bir antibiyotiktir. Bakterileri öldürücü etkisi güçlüdür. Tüberküloz hastalığına yol açan mikroorganizma üstünde de etkilidir.

Doktorunuz size RİFETEM'i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:

- Gram pozitif mikroorganizmalardan ileri gelen duyarlı bakterilerle oluşan ve özellikle diğer antibiyotik tedavilerinin cevap vermediği durumlarda,

- Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Çıban (füronküloz), irinli deri enfeksiyonu (piyodermit), irin kesesi (apse), lenf bezi iltihabı (lenfadenit)
- Kemik iltihabı (osteomyelit)
- Gram-pozitif mikroorganizmalardan ileri gelen bronkopulmoner enfeksiyonlar, stafilokokal bakteremi (kanda stafilokok adı verilen bakterilerin çoğalması)
- Gram-negatif mikroorganizmalar veya karışık floranın neden olduğu enfeksiyonlar da dahil safra yolları ile ilgili bakteriyel (örneğin safra kesesi iltihabı) bir enfeksiyonunuz (kolesistit) ya da karaciğerdeki safra yollarınızda iltihap (hepatokolanjit) varsa ve safra yollarıyla ilgili bir ameliyat geçirmeniz söz konusuysa, enfeksiyondan korunmanız için

2. RİFETEM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Rifetem’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer,

- RİFETEM’in içindeki etkin madde olan rifamisine veya ilacın içerdiği diğer maddelerden lidokaine karşı alerjiniz varsa,
- Ağır karaciğer yetmezliği adı verilen ciddi bir rahatsızlığınız varsa,
- Safra yollarınızda tıkanmaya yol açan bir rahatsızlığınız varsa,
- Hamile olma ihtimaliniz varsa veya hamileliğinizin ilk üç ayı içindeyseniz,
- Sarılıksanız,
- Sakinavir/ritonavir kombinasyonları (HIV enfeksiyonu için kullanılır) kullanıyorsanız,
- Lidokain ve lidokainin içinde bulunduğu amid tipi anesteziğe karşı alerjiniz varsa,
- Kalbinizde kalp pili olmaksızın kalp bloğunuz (kalp atımında bozukluk) varsa,
- Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,
- Damar içine,
- 30 aylıktan küçük yenidoğanlarda uygulanmamalıdır.

RİFETEM’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

- Karaciğer rahatsızlığınız varsa,
- Herhangi bir böbrek probleminiz varsa ve eğer günde 600 mg’dan daha fazla RİFETEM alıyorsanız,
- Diyabet hastası iseniz; bu ilacı alırken diyabetinizi kontrol altına almanız zorlaşabilir.
- Seyrek olarak kan problemleri yaşıyorsanız (porfiri),
- Çocuklarda kullanılıyorsa,
- 65 yaşın üzerindeyseniz,
- Tüberküloz için tedavi oluyorsanız (Doktorunuz tedavinin başlangıcında karaciğer fonksiyonlarınızı ve kan tablounuzu yapacağı tetkiklerle değerlendirecektir ve tedavi süresince düzenli aralıklarla kontrolleri tekrarlayacaktır, çocuklarda eğer komplikasyon oluşturan bir durum yoksa başlangıç testleri gerekli değildir).
- İzoniazid ile birlikte kullanılması durumunda, karaciğer problemleri olanlarda, beslenme bozukluğu olanlarda dikkatli kullanılması gerekir.

- Eđer daha 6nceden geirmiş olduėunuz karaciėer problemleriniz yok ise ve karaciėer fonksiyonlarınız normal ise; ateş, kusma, sarılık vb bir problem durumunda d6zenli olarak karaciėer fonksiyonlarınız test edilmelidir.
- Ani aşıırı duyarlılık tepkisi oluşabilir. Bu durum daha ok aralıklı tedavi ile ortaya ıkar (haftada 2 veya 3 kezden az); bu nedenle doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyecektir.
Tedavi řeklinizi bozmayınız, ani aşıırı duyarlılık tepkileri artabilir.
- Diėer antibiyotiklerde olduėu gibi, rifamisin uzun s6reli kullanımı, direnli olmayan organizmaların (6zellikle stafilokok) s6perenfeksiyon adı verilen aşıırı oėalmasına sebep olabilir. Hastanın durumunun tekrarlayan deėerlendirmeleri 6nemlidir. Eđer s6perenfeksiyon oluşursa, tedaviye ara verilmeli ve uygun tedavi y6ntemleri uygulanmalıdır.
- RİFETEM uygulanması belli bir zamanla sınırlandırılmalıdır ve eđer m6mk6nse d6ş6k doz ve alternatif diėer terap6tik ajanlarla birlikte uygulanmalıdır.
- Y6ksek dozda RİFETEM alındıėında idrarda kırmızıya yakın renklenme g6r6lebilir; ancak endişelenilecek bir durum deėildir.
- Safra yollarında tıkanma gelişme ihtimali varsa veya karaciėer işlevlerinizde ciddi bozukluk varsa. Bu gibi durumlarda ilacın v6cuttan atılması g6leşir ve kandaki seviyesi artabilir. RİFETEM'in dozu azaltılmalıdır.
- Lidokain ierdiėi iin, sinir dokularına yakın b6lgeye enjekte edilmesinden kaınılmalıdır.
- 3 yaşıından k66k ocuklarda kullanılmamalıdır.
- RİFETEM v6cuttaki b6brek 6st6 bezi ve tiroid hormonları ile D vitamininin metabolizmasını hızlandırarak azalmalarına yol aabilir.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir d6nemde dahi olsa sizin iin geerliyse, l6tfen doktorunuza danıřın.

RİFETEM'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

RİFETEM ampul, kas iine enjekte edilerek kullanılır. Bu y6zden yiyecek ve iecek ile etkileşmesi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan 6nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

RİFETEM doėum kontrol ilalarının etkinliėini azaltabilir. Bu durumda farklı bir doėum kontrol y6ntemi kullanmalısınız. Spiral ya da kondom gibi g6venli bir doėum kontrol y6ntemi kullanmalısınız. Bu konuda emin deėilseniz doktorunuz veya eczacınızla konuřunuz.

Rifamisin hamileliėin son birkaç haftası iinde kullanılırsa, anne ve ocukta doėum sonrasında kanamalara neden olabilir. Bu nedenle doktorunuz ancak bebekte oluşabilecek risklere karřı ilacın size saėlayacaėı faydanın daha aėır bastıėına karar verirse, ilacı kullanmanızı 6nerebilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduėunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlaç anne sütüne geçer. Bu nedenle doktorunuz ancak bebekte oluşabilecek risklere karşı ilacın size sağlayacağı faydanın daha ağır bastığına karar verirse emzirme sırasında ilacı kullanmanızı önerebilir.

Araç ve makine kullanımı

RİFETEM'in araç ve makine kullanma becerileri üstünde bilinen bir etkisi yoktur.

RİFETEM'in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

RİFETEM içinde yardımcı madde olarak potasyum metabisülfid bulunur. Nadir olarak şiddetli Aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma neden olabilir.

Bu tıbbi ürün her bir dozunda 1 mmol (23mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani sodyum içermediği kabul edilebilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlar karaciğerde metabolize edildiğinden, RİFETEM ile birlikte kullanılması gereken durumlarda dozlarının ayarlanması gerekebilir. Bu durumda doktorunuz sizin için uygun dozları ayarlayacaktır.

- Epilepsi (havale) tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn: fenitoin),
- Kalpte ritim bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. dizopiramid, meksiletin, kinidin, propafenon, tokainid),
- Hormon antagonistleri (örn. antiöstrojenler, tamoksifen, toremifen, gestinon),
- Psikotik bozukluklarda kullanılan ilaçlar (örn. haloperidol, aripiprazol),
- Pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar (örn: kumarin, varfarin),
- Mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn: flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol),
- Viral hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn: zidovin, sakinavir, indinavir, efavirenz, amprenavir, nelfinavir, atazanavir, lopinavir, nevirapin),
- Uyku bozukluklarının tedavisinde kullanılan barbitüratlar,
- Yüksek tansiyon ve koroner kalp hastalığı tedavisinde kullanılan beta-blokerler (örn: bisoprolol, propranolol), kalsiyum kanal blokerleri (örn.: diltiazem, nifedipin, verapamil, nimodipin, isradipin, nikardipin, nisoldipin),
- Kaygı giderici ilaçlar (anksiyolitikler) ve uykuya yardımcı olan ilaçlar (hipnotikler) (örn: diazepam, benzodiazepinler, zolpiklon, zolpidem),
- Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotikler (örn: kloramfenikol, klaritromisin, dapson, doksisisiklin, florokinolonlar, telitromisin)
- İltihabi durumların tedavisinde kullanılan kortikosteroidler,
- Kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (digitoksin, digoksin),
- Kolesterolü düşürmek için kullanılan ilaçlar (klofibrat, simvastatin),
- Sistemik hormonal doğum kontrol ilaçları (östrojenler, progestojenler),
- Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn: klorpropamid, tolbutamid, sülfanilüreler, rosiglitazon),

- Bağıışıklık sistemini baskılayan ilaçlar, (örn. siklosporinler, sirolimus, takrolimus),
- Tiroid hormonu (levotiroksin),
- Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar losartan, enalapril,
- Ağrı kesiciler (örn: metadon, narkotik analjezikler),
- Barsak kurtlarının tedavisinde kullanılan prazikuantel,
- Sıtma tedavisinde kullanılan kinin,
- Sinirlerle ilgili bir hastalığın tedavisinde kullanılan riluzol,
- Bulantı ve kusma tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. ondansetron),
- Astım tedavisinde kullanılan teofilin,
- Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn: amitriptilin, nortriptilin),
- Kanser tedavisinde kullanılan sitotoksik ilaçlar (örn: imatinib, irinotekan),
- İdrar söktürücüler (örn: eplerenon)

Sistemik hormonal doğum kontrol yöntemi kullanıyorsanız, RİFETEM ile tedaviniz sırasında hormonal olmayan doğum kontrol yöntemleri uygulamalısınız.

Atovakon ve rifamisin birlikte kullanıldığında, atovakon konsantrasyonlarının azaldığı (>%50 oranında) ve rifamisin konsantrasyonlarının arttığı (>%30 oranında) gözlenmiştir.

Ketokonazol ve RİFETEM'in birlikte kullanılması, her iki ilacın serum konsantrasyonlarının azalmasıyla sonuçlanmıştır.

RİFETEM ve enalaprilin birlikte kullanılması, enalaprilin aktif metaboliti olan enalaprilatın konsantrasyonlarında azalmayla sonuçlanmıştır. Doktorunuz bu ilaçları kullanıyorsanız sizin için dozu ayarlayacaktır.

Birlikte antiasit uygulanması, RİFETEM'in emilimini azaltabilir. Günlük RİFETEM dozları antasitlerin alınmasından en az 1 saat önce verilmelidir.

Özellikle aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız RİFETEM kullanmayınız ve doktorunuza söyleyiniz:

- Sakinavir veya ritonavir (HIV enfeksiyonu için kullanılır)

P. aminosalisilik asit (PAS) gibi tüberküloz tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar: PAS ve RİFETEM en az 8 saat ara ile alınmalıdır.

RİFETEM halotan ya da izoniazid ile birlikte verildiğinde, karaciğerde fonksiyon bozukluğu (toksikite) potansiyeli artar. RİFETEM'in halotan veya izoniazid birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

Serumda folat ve B12 vitamini tayin testleri ve safra kesesinin görüntülenmesi önemlidir. Rifamisin bu maddelerin standart laboratuvar tayinlerini baskılar ve safra kesesinin görüntülenmesi için kullanılan kontrast maddenin safrayla atılmasını bozabilir. Alternatif

tain yöntemleri kullanılmalıdır ve bu testler rifamisinin sabah dozu alınmadan önce gerçekleştirilmelidir.

Opiat (uyuşturucu) tarama testlerinde bazı yöntemlerde yanlış pozitif sonuç verebilir. (Gaz kromatografisi/kütle spektrometrisi adı verilen doğrulama testleri kullanılmalıdır.)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. RİFETEM nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

RİFETEM, 250 mg'lık ampul halindedir.

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Yetişkinler için günlük doz 12 saat arayla bir RİFETEM 500 mg ampuldür. Doz, doktor gözetiminde olmak şartı ile 8 saatte bir 500 mg'a yükseltebilir.

Ateş düştükten sonra tedaviye birkaç gün devam edilir.

Uygulama yolu ve metodu:

Kas içinde uygulanır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Doktorunuz çocuğunuzun yaşı, vücut ağırlığı ve hastalığına bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecektir.

25 kg'dan fazla olan 6 yaşın üstündeki çocuklar için günlük doz 12 saat arayla bir RİFETEM 500 mg ampuldür. Bu doz doktor gözetiminde olmak şartı ile 8 saatte bir 500 mg'a yükseltebilir.

Daha küçük çocuklar (≤ 6 yaş ve ≤ 25 kg) için genellikle ortalama 10-30 mg/kg/günlük doz tavsiye edilir.

Ateş düştükten sonra tedaviye birkaç gün devam edilir.

3 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda ve genel durumu bozuk hastalarda doktorunuz böbrek ve karaciğer fonksiyonlarındaki olası bozulmaları göz önünde bulundurarak dozda ayarlama yapacaktır.

Özel kullanım durumları:

Karaciğer/böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerekmez.

Doktorunuz hastalığınıza ve karaciğer problemlerinizin ciddiyetine bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

Eğer RİFETEM'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla RİFETEM kullandıysanız:

RİFETEM, doktor denetiminde kullanılacağı için, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken tedbirler alınacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise uygun tedavi yapılacaktır.

RİFETEM'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

RİFETEM'i kullanmayı unutursanız:

RİFETEM, doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

RİFETEM ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

RİFETEM tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, hastalığınız yeniden ortaya çıkabilir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, RİFETEM'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, RİFETEM'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Aşırı duyarlılık reaksiyonları: Döküntü, yutkunma ve nefes alma problemleri, hırıltılı ses, dudak, yüz, boğaz veya dilde şişme,
- Ateşiniz varsa ve derinin ve gözlerinizin beyaz bölümlerinin sararması, yorgun, hasta hissetme, iştah kaybı (anoreksi), bulantı, kusma gibi belirtiler ortaya çıktıysa bunlar karaciğer problemlerinin erken belirtileri olabilir.
- Derinizin bazı kısımlarında kabarcık oluşumu, döküntü, kanama, yara oluşumu, sıvı dolu kabarcık oluşumu varsa. Bu durum dudak, göz, ağız, burun, genital bölgeler, el veya ayaklarınızda oluşabilir. Ciddi deri problemlerinin belirtileri olabilir.
- Normalden daha hızlı morarma, ezilme oluşuyorsa veya ağrılı koyu kırmızı döküntü oluşumu varsa (purpura). Bu durum ciddi kan problemlerinin belirtisi olabilir.
- Titreme, yorgunluk, solgunluk, sık nefes alıp verme, hızlı kalp atışı veya koyu renkli idrar. Bu belirtiler anemi belirtisi olabilir.
- Aniden başlayan şiddetli baş ağrısı. Beyin kanamasının belirtisi olabilir.

- İdrarınızda kan varsa ya da idrar miktarınızda artış ya da azalma varsa. Özellikle ayaklarınız, ayak bileğiniz ve bacaklarınızda ödem geliyorsa. Bu belirtiler ciddi böbrek problemlerinin belirtisi olabilir.
- Sık nefes alıp verme, nefes darlığı,
- Kafanız karışmış, uykulu iseniz, soğuk ve nemli bir cildiniz varsa, nefes almada güçlük çekiyorsanız, kalp atışınızda hızlanma varsa veya deriniz normale göre daha solgun ise. Bu belirtiler şok belirtileri olabilir.
- Normalden daha çabuk hastalanıyorsanız, ateşiniz, acılı boğaz ağrınız varsa veya ağzınızda yaralar oluşuyorsa, bu durum beyaz kan hücrelerinizin sayısında düşüklüğü gösteriyor olabilir.
- Burun, kulak, diş eti, boğaz, deri ve mide kanaması geçirirseniz. Bunların belirtisi; yorgunluk ve karında şişlik, derinizde mor halkalar ve dışkıınızın siyah veya katran rengine olması da dahildir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin RİFETEM'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Anormal düşünceler, farklı şeyleri görme ile birlikte mental problemler (halüsinasyon),
- Durdurulamayan şiddetli sulu ishal ve kendinizi zayıf hissetme, ateş. Bu durum Psödomembranöz kolit belirtileri olabilir.
- Grip benzeri belirtiler: titreme, ateş, halsizlik ve kemik ağrıları,
- Yüz, karın, kol veya bacaklarda su toplanması (ödem),
- Kas zayıflığı ve ağrısı veya kas refleks kaybı,
- Halsizlik, bitkinlik ve hızlı oturup kalktığınız zaman bayılma (düşük kan basıncından dolayı),
- El ve ayak parmaklarında ve ayak bileğinde şişlik,
- Konsantrasyon güçlüğü, sinirlilik, gerginlik ve depresyon durumu,
- Çok yorgun, zayıf hissetme veya uyuma da güçlük,
- Kısa süreli hafıza kaybı, anksiyete, tepkisizlik veya geç tepki verme,
- Kas veya diğer dokularda kayıp,
- Kilo kaybı, gece terlemesi ve ateş. Bu belirtiler eozinofili olarak adlandırılan bir kan durumunun belirtileri olabilir.
- Hasta olma ya da kendini hasta hissetme hali

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Aşağıdaki yan etkiler eğer şiddetli ise veya birkaç günden uzun sürer ise doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:
- Derinizde kızarıklık veya kaşıntı,

- İshal veya mide rahatsızlıkları,
- İştah kaybı (anoreksi),
- Baş ağrısı,
- Adet düzensizliği (uzun süreli kullanan tedavi uygulanan kadınlarda),
- Saç kaybı,
- Diğer yan etkiler:
- İdrarınız, ter, tükürük, balgam veya gözyaşınızın kırmızımsı veya turuncu olduğunu fark ederseniz. Bu durum yaygın olarak görülür. Yumuşak kontakt lensinizde kalıcı olarak boyama yapabilir. RİFETEM kullanmayı bıraktıktan sonra bir süre daha gözyaşınızdaki kırmızı renk devam edebilir.

Bunlar RİFETEM'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. RİFETEM'in saklanması

RİFETEM'i çocukların göremeyeceği veya erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra RİFETEM'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

İ.E. Ulagay İlaç Sanayii Türk A.Ş. Maslak Mah. Sümer Sok. No: 4 Maslak Office Building
Kat: 7-8 34485 Maslak, Sarıyer/İstanbul

Üretim yeri:

İdol İlaç Dolum Sanayi Tic. A.Ş.
Davutpaşa Cad. CebeAli Bey Sok. No:20 Zeytinburnu/İstanbul (34010)
Tel: (0212) 449 00 00
Faks: (0212) 449 00 20

Bu kullanma talimatı .././.... tarihinde onaylanmıřtır.