

## KULLANMA TALİMATI

### POTANT 750 mg film tablet

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Levofloksasin hemihidrat (750 mg levofloksasine eşdeğer) 768.69 mg
- **Yardımcı maddeler:** Hidroksipropil metilselüloz, Krosповidon, Mikrokrystalin selüloz, Sodyum stearil fumarat, Opadry white (Y-1-7000).  
Opadry white (Y-1-7000); HPMC 2910/Hipromellos 5cP, Titanium dioksit (E171), Macrogol /PEG 400 içerir.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **POTANT nedir ve ne için kullanılır?**
2. **POTANT'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **POTANT nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **POTANT'ın saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. POTANT nedir ve ne için kullanılır?**

- POTANT ağız yolu ile uygulanan, sentetik, fluorokinolon türevi geniş spektrumlu bir antibakteriyeldir. Akciğer, sinüs, deri ve idrar yolu enfeksiyonu tedavisinde kullanılır.
- POTANT, 7 ve 14 film tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilir.

**Bakterilerin neden olduğu yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının akut iltihabı (Akut bakteriyel sinüzit), kronik bronş iltihabının akut alevlenmesi (kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi) ve komplike olmayan böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlarında alternatif tedavi seçeneklerinin varlığında ciddi yan etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır. Buna ilave olarak böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlarında antibiyogramla duyarlık kanıtlanması gerekmektedir.**

- POTANT aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:
  - Akut sinüzit
  - Kronik bronşitin akut alevlenmesi
  - Hastane kaynaklı (nozokomiyal) pnömoni
  - Toplumdan edinilmiş pnömoni

- Piyelonefrit dahil, komplike üriner sistem enfeksiyonları
- Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonları
- Komplike deri ve yumuşak deri enfeksiyonları
- Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
- Kronik bakteriyel prostatit

## 2. POTANT'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

### **UYARI: KAS KİRİŞİ İLTİHABI (TENDİNİT) VE KAS KİRİŞİ (TENDON) YIRTILMASI, SINIRLERİN ZARAR GÖRMESİ (PERİFERAL NÖROPATİ), SANTRAL SINIR SİSTEMİ ETKİLERİ VE KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ HASTALIĞININ (MYASTENİA GRAVİS'İN) ŞİDDETLENMESİNİ DE İÇEREN CİDDİ ADVERS REAKSİYONLAR**

- POTANT da dahil olmak üzere florokinolonlar aşağıdaki gibi sakatlığa yol açan ve geri dönüşümsüz advers reaksiyonlara neden olabilir:
  - Kas kirişi iltihabı (tendinit) ve kas kirişi (tendon) yırtılması
  - Sinirlerin zarar görmesi (periferal nöropati)
  - Santral sinir sistemi etkileri

Bu reaksiyonlardan herhangi birinin gözlemlendiği hastalarda POTANT kullanımı derhal bırakılmalı ve florokinolon kullanımından kaçınılmalıdır.
- POTANT da dahil olmak üzere florokinolonlar, myastenia gravisli hastalarda kas güçsüzlüğünü şiddetlendirebilir. Bilinen myastenia gravis öyküsü olanlarda POTANT kullanımından kaçınılmalıdır.
- POTANT'ın da dahil olduğu florokinolon grubu ilaçların ciddi advers reaksiyonlarla ilişkili olduğu bilindiğinden aşağıdaki endikasyonlarda başka alternatif yoksa kullanılabilir.
  - Bakterilerin neden olduğu yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının akut iltihabı (Akut bakteriyel sinüzit)
  - Komplike olmayan böbrek ve idrar yolu enfeksiyonu
  - Kronik bronş iltihabının akut alevlenmesi (kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi)

### **POTANT'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer:

- Levofloksasin veya florokinolon grubu bir diğer antibakteriyel ilaca karşı alerjiniz varsa,
- Nöbet (konvülsiyon) riskini attırabileceğinden, epilepsi (sara) hastalığınız varsa,
- Florokinolon grubu bir antibakteriyelin kullanımına bağlı geliştiği bilinen tendon rahatsızlığınız (örneğin tendinitis) varsa,
- POTANT tedavisi sırasında veya hemen sonrasında, ciddi, kalıcı ve/veya kanlı ishal gelişirse,
- Hamileyseniz veya süt verme dönemindeyseniz,
- Tabletler sadece yetişkinlerin kullanımı için olduğundan, 18 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.

## **POTANT'ı ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eęer:

- Bilinen bir kalp hastalıęınız ya da kalpte iletim ile ilgili aile hikayeniz var ise,
- Diyabet (řeker) hastalıęınız var ise ve antidiyabetik ila kullanıyorsanız,
- Sara nbeti geirdi iseniz ve sinir sistemi hastalıęınız var ise,
- Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksiklięi hastalıęınız var ise,
- Bbrek ile ilgili sorunlarınız var ise,
- Gneř iřığına ve solaryum gibi yapay ultraviyole lambalarına direkt maruz kalıyorsanız, POTANT'ı dikkatli kullanınız.

### **Kas kiriři iltihabı (tendinit) ve kas kiriřinin yırtılması (tendon rptr), sinirlerin zarar grmesi (periferal nropati) ve merkezi sinir sistemi etkileri dahil sakatlıęa sebep olan ve potansiyel geri dnřmsz ciddi yan etkiler**

POTANT dahil florokinolonlar, sakatlıęa sebep olabilen ve potansiyel geri dnřmsz ciddi yan etkilerle iliřkilendirilmiřtir. Yaygın olarak grlen yan etkiler kas-iskelet ve periferal sinir sistemi (Kas kiriři iltihabı, kas kiriřinin yırtılması, kas kiriřlerinde řiřme veya iltihap, karıncalanma veya uyuřma, kol ve bacaklarda uyuřukluk, kas aęrısı, kas gçszlę, eklem aęrısı, eklemlerde řiřme gibi) eklem aęrısı, kas aęrısı, sinirlerin zarar grmesi ve merkezi sinir sistemi etkileridir (halsinasyon, kaygı, depresyon, intihar eęilimi, uykusuzluk, řiddetli bař aęrısı ve zihin karıřıklıęı).

Bu yan etkiler, POTANT bařladıktan sonra saatler ya da haftalar iinde grlebilir. Her yař grubundan veya nceden mevcut risk faktrleri olmayan hastalar, bu yan etkileri yařamıřtır.

Herhangi bir ciddi yan etkinin ilk bulgularının veya semptomlarının ortaya ıkması durumunda POTANT derhal kesilmelidir. Ayrıca, florokinolonlarla baęlantılı olarak bu ciddi yan etkilerden herhangi birini yařayan hastalarda POTANT dahil florokinolonların kullanımından kaınılmalıdır.

Bu uyarılar gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

### **POTANT'm yiyecek ve iecek ile kullanılması**

POTANT'ı yiyecekle birlikte veya a karnına alabilirsiniz.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Hamile kadınlarda yapılmıř yeterli ve iyi kontroll alıřmalar mevcut deęildir, bu nedenle POTANT sadece doktor tarafından zorunlu grlrse hamile kadınlarda kullanılabilir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Ciddi potansiyel yan etkiler nedeniyle emziren annelerde emzirmenin mi, yoksa ilacın mı kesileceęine doktor karar verecektir.

### **Araç ve makine kullanımı**

POTANT ile tedavi sırasında görülen baş dönmesi, sersemlik hali, görme bozuklukları gibi bazı yan etkiler, konsantrasyon ve reaksiyon yeteneklerinizi azaltabilir. Bu yeteneklerinizin azaldığını hissederseniz, motorlu taşıt veya iş makinesi kullanmayınız.

### **POTANT'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Uyarı gerektiren yardımcı madde içermemektedir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

- Demir tuzları, magnezyum veya alüminyum içeren antasidler ile POTANT birlikte alındığında, POTANT'ın emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilaçları, POTANT uygulamasından en az iki saat önce veya iki saat sonra kullanınız.
- Sukralfat, POTANT birlikte alındığında, POTANT'ın emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilacı, POTANT uygulamasından iki saat sonra kullanınız.
- Romatizmal ağrı ve romatizmal iltihap için alınan fenbufen ve benzeri ilaçlar ve teofilin sara nöbet riskini artırabilir.
- POTANT ile K vitamini antagonisti olan varfarinin birlikte kullanımı esnasında protrombin zamanı ve kanama belirtileri takip edilmelidir.
- Nonsteroidal antiinflamatuar bir ilacın, POTANT ile birlikte kullanılması halinde, beyin konvülsiyon eşiğinde düşme riski artabilir.
- POTANT ve antidiyabetik ilaçların birlikte kullanımı esnasında kan şekerinin yükselmesi ya da düşmesi (hiperglisemi-hipoglisemi) bildirilmiştir. Bu nedenle birlikte kullanımlarında kan şeker düzeyleri izlenmelidir.
- Probenesid ve simetidin böbreklerin ilacı atma yeteneğini azaltabilir.
- POTANT siklosporin'in etkisini uzatabilir.
- Sınıf IA ve Sınıf III kalp atışlarını düzenleyici (antiaritmik) ilaçlar, depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (trisiklik antidepressan), bir tür antibiyotik olan eritromisin ve reflü hastalığında kullanılan bir ilaç olan sisaprid ile POTANT birlikte kullanıldığında kalp atışlarında düzensizlik (aritmî) oluşabilir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. POTANT nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

- Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve POTANT ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.
- POTANT'ın önerilen dozu günde bir veya iki tablettir.
- Dozaj, enfeksiyonun tipine, şiddetine ve etken patojenin duyarlılığına bağlı olarak doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.
- Tedavi süresi hastalığın gidişine bağlı olarak değişir.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

- POTANT, ağız yoluyla alınır. Çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı ile alınmalıdır.

- Tabletler yemek sırasında veya yemek arasında alınabilir.
- Tabletleri günün aynı saatinde alınız.

#### **Değişik yaş grupları:**

#### **Çocuklarda kullanımı:**

18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

#### **Yaşlılarda kullanımı:**

Böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde olan yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

#### **Özel kullanım durumları:**

##### **Böbrek yetmezliği:**

Böbrek yetmezliğinde POTANT dozunun ayarlanması gerekir. POTANT kullanımında birikimi önlemek için doz doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

##### **Karaciğer yetmezliği:**

Karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.

*Eğer POTANT'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla POTANT kullandıysanız:**

*POTANT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

Aşırı doz alımının sonuçları, zihin karışıklığı, sersemlik, bilinç kaybı ve nöbet gibi merkezi sinir sistemi belirtileri ve kalp ritmi anormalliğine yol açabilecek kalp rahatsızlıklarıdır. Aşırı doz alımının tedavisinde, levofloksasin diyaliz yöntemi ile vücuttan uzaklaştırılmaz. Belirli bir antidotu yoktur.

#### **POTANT'ı kullanmayı unutursanız:**

İlacınızı almayı unutursanız, hatırladığınız anda unuttuğunuz dozu alınız.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

#### **POTANT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Bulunmamaktadır. Ancak kendinizi daha iyi hissetseniz bile, ilaçlarınızı tedavi süreniz bitene kadar kullanınız.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi POTANT'a duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, POTANT'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Alerjik reaksiyonlar
- Tendon iltihaplanması ve ağrı
- Tendon yırtılması
- Eklem ağrısı
- Kas ağrısı
- Kas yorgunluğu
- Kan şekerinin düşmesi
- Ciddi, kalıcı ve/veya kanlı ishal

- İntihar düşüncesi veya davranışları riski gibi kendine zarar verme ile seyreden psikotik reaksiyonlar
- Hayal görme
- Kalp atım ritminin bozulması
- Ateş

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin POTANT'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Psikotik reaksiyon, sinirlilik, huzursuzluk, gerginlik
- Sıkıntı hissi, depresyon
- Sara nöbeti
- Titreme
- Bilinç bulanıklığı
- Görme ve duyma bozuklukları
- Tat ve koku alma bozuklukları
- His azalması
- Çarpıntı
- Kan basıncının düşmesi
- Nefes darlığı
- Kansızlık
- İshal
- Karın ağrısı
- Kusma
- Deri döküntüsü
- Kaşıntı

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Baş ağrısı
- Baş dönmesi
- Kulak çınlaması
- Uykusuzluk
- Uyuşma
- Bulantı
- İştah kaybı
- Hazımsızlık
- Mide yanması
- Kızarıklık
- Halsizlik

▪ Mantar enfeksiyonu

Bunlar POTANT'ın hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

**5. POTANT'ın saklanması**

*POTANT'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve nemden koruyarak saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra POTANT'ı kullanmayınız.*

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

**Ruhsat sahibi** : Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
34460 İstinye - İstanbul

**Üretim yeri** : Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
34580 Silivri - İstanbul

*Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.*