

## KULLANMA TALİMATI

**MARKES % 0,25 gargara**  
**Ağızda çalkalanarak uygulanır.**

- **Etkin madde:** 200 ml gargara 0,50 g flurbiprofen içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Gliserin, etil alkol (% 96), sorbitol (E 420), kremofor RH40, sodyum sakkarin, sodyum hidroksit, sodyum benzoat (E 211), nane esansı, deiyonize su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **MARKES nedir ve ne için kullanılır?**
2. **MARKES'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **MARKES nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **MARKES'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. MARKES nedir ve ne için kullanılır?**

Orofarenjiyal alana bağlı (örn. dişeti iltihapları, ağız iltihapları, yutak iltihapları) ağrılarda rahatsızlığı giderici, antiinflamatuvar olarak semptomatik tedavide kullanılır. Diş tedavileri sonrası da koruyucu olarak kullanılır.

MARKES, 200 ml bal renkli cam şişede, 15 mL ölçek ile birlikte karton kutu ambalajda sunulmaktadır. Renksiz, berrak, aromatik kokulu çözüldür.

#### **2. MARKES'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**MARKES'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer,

- Flurbiprofene veya ürün formülünde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyetiniz varsa,
- Asetilsalisilik asit veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı hassasiyetiniz varsa,
- Önceden bronkospazm (bronşiyal daralma nedenli nefes alma güçlüğü), asetilsalisilik asit ya da diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların kullanımına bağlı rinit ya da ürtiker geçirdiyse,
- Peptik ülseriniz varsa veya bu hastalığı geçirdiyse.

## **MARKES'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eđer,

- Böbrek yetmezliđi, kalp yetmezliđi ya da karaciđer yetmezliđiniz varsa.

Bu uyarılar geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

### **MARKES'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

MARKES'in kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve ieceklerle etkileřimi yoktur.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

MARKES kullanırken emzirmeye son verilmeli ya da ilaç kesilmelidir.

### **Ara ve makine kullanımı**

MARKES'in ara ve makine kullanımına olan etkisi konusunda alıřılmamıřtır, fakat farmakodinamik özellikleri ve genel emniyet profiline dayanılarak bir etki oluřması beklenmez.

### **MARKES'in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

MARKES, yardımcı madde olarak sorbitol (E420), gliserin, sodyum ve etanol ierir. Ancak kullanım yolu nedeniyle herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

MARKES, 200 ml'sinde 0,4 g sodyum benzoat (E211) iermektedir. Deriye, göze ve mukoz membranlara hafif derecede iritan etki gösterebilir.

### **Diđer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

MARKES, furosemidin diüretik faaliyetini nadiren azaltabilir. Ayrıca, flurbiprofen nadiren antikoagölan ilaçlarla etkileřime girebilir. Bunun yanı sıra flurbiprofenin digoksin, tolbutamid ve antiasit ile etkileřimi bulunmamaktadır.

*Eđer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. MARKES nasıl kullanılır?**

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklıđı için talimatlar:**

Yarım bardak suya 10 ml gargara solüsyonu ilave edilir ve günde iki veya üç defa alkalama veya gargara yapılır.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

MARKES gargara ađızda alkalamak ve/veya gargara yapmak iindir. Gargara yaptıktan sonra kalan kısım dıřarı atılmalı, yutulmamalıdır.

- **Deđişik yař grupları**

**Pediyatrik popölasyon:**

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

**Geriyatrik popülasyon:**

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktadır.

• **Özel kullanım durumları**

**Böbrek yetmezliği:**

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

**Karaciğer yetmezliği:**

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

*Eğer MARKES'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla MARKES kullandıysanız**

*MARKES'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**MARKES'i kullanmayı unutursanız**

*İlacınızı kullanmayı unutursanız bekleyiniz ve bir sonraki dozunu zamanında alınız.*

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**MARKES ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

MARKES ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, MARKES'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz**

- Hassasiyet bulguları
- Lokal iritasyonlar

Bunlar MARKES'in hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

**Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

**5. MARKES'in saklanması**

*MARKES'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Kutu üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra MARKES'i kullanmayınız.*

**Ruhsat Sahibi:** Angelini İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Büyükdere Cad. No: 103/B Şarlı İş Merkezi, B Blok Mecidiyeköy-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 266 24 23

Faks: (+90 212) 266 24 22

**Üretim yeri:** Santa Farma İlaç San. A.Ş.

Sofalçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edirnekapı-İSTANBUL

Tel: (+90 212) 534 79 00

Faks: (+90 212) 521 06 44

*Bu kullanma talimatı 31.08.2015 tarihinde onaylanmıştır.*