

KULLANMA TALİMATI

BECOVİTAL şurup

Ağızdan uygulanır.

Etkin maddeler: Her bir ölçek (5 ml) şurup 5 mg Tiamin HCl, H₂O, 2 mg Piridoksin HCl, 2,75 mg Riboflavin-5-fosfat sodyum 2H₂O, 20 mg Nikotinamid, 3 mg Dekspantenol içerir.

Yardımcı maddeler: Gliserin, sukroz, alkol, sodyum benzoat, sitrik asit, limon esansı, portakal esansı, frenk üzümü esansı, kavun esansı, ahududu esansı, grenadin esansı, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **BECOVİTAL nedir ve ne için kullanılır?**
2. **BECOVİTAL 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **BECOVİTAL nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **BECOVİTAL'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. BECOVİTAL nedir ve ne için kullanılır?

BECOVİTAL sarı renkte, berrak aroma kokulu homojen sıvı şeklinde bir üründür. Vücut için gerekli olan bazı vitaminleri içermektedir.

BECOVİTAL şurup; içeriğinde yer alan vitaminlerin birlikte eksikliğinin görüldüğü durumlarda

kullanılır.

2. BECOVİTAL'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BECOVİTAL'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- İlacın içerisinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz veya dayanıksızlığınız var ise,
- Hiperkalsemisi (kanda kalsiyum miktarının normalden fazla olması) tedavisi görüyorsanız,

BECOVİTAL'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer aşağıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse BECOVİTAL kullanmadan önce doktorunuza danışınız:

- B₁₂ vitamini eksikliğiniz var ise
- Herhangi bir kalp veya damar hastalığınız var ise
- Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk var ise
- Böbreğinizde taşı var ise

Bileşiminde yer alan B₂ vitamininden dolayı idrarı sarıya boyayabilir. İdrardaki bu renk değişikliği herhangi bir zararlı etkinin sonucu değildir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BECOVİTAL'in yiyecek ve içecek ile kullanılması

BECOVİTAL'i yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer üç aylık hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz. Ancak hamileliğiniz sırasında BECOVİTAL kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar vermelidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

BECOVİTAL'in araç ve makine kullanımını üzerine olumsuz bir etkisi yoktur.

BECOVİTAL'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BECOVİTAL şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi üründe hacmin % 3,8' si kadar etanol (alkol) vardır; örneğin her dozda 190 mg'a kadar, her dozda 3,8 mL biraya eşdeğer, her dozda 1,58 mL şaraba eşdeğer gibi.

Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir.

Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalarda dikkate alınmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilacı kullanıyorsanız BECOVİTAL almadan önce doktorunuza söylemelisiniz:

- Levodopa (Parkinson hastalığında kullanılır)

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. BECOVİTAL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; aç veya tok karnına,

Erişkinlerde

1 ölçek (5 mL).

Çocuklarda

4-18 yaş arası çocuklarda 1 ölçek (5 mL)

4 yaş altındaki çocuklara önerilmemektedir.

Uygulama yolu ve metodu:

Ağızdan uygulanmaktadır. İlacınızı aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Değişik yaş grupları:**Çocuklarda kullanımı:**

4 yaş altındaki çocuklara önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlılarda kullanılan doz ile ilgili bilgi yoktur.

Özel kullanım durumları**Böbrek/karaciğer yetmezliği:**

Böbrek veya karaciğer yetmezliği var ise BECOVİTAL kullanmadan önce doktorunuz ile konuşmalısınız.

Eğer BECOVİTAL'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BECOVİTAL kullandıysanız:

Eğer aynı anda kullanmanız gerekenden fazla aldıysanız ya da bir çocuğun herhangi birisini almış alabileceğini düşünüyorsanız en yakın hastaneyle temasa geçiniz ya da hemen doktorunuza söyleyiniz.

BECOVİTAL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BECOVİTAL'ü kullanmayı unutursanız:

Eğer ilacınızı kullanmayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz alınız ve sonra bir sonraki dozu doğru zamanda alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

BECOVİTAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

BECOVİTAL ile tedaviniz bittiğinde olumsuz bir etki beklenmemektedir.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, BECOVİTAL'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa, BECOVİTAL'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.
- İlacı aldıktan kısa bir süre sonra kaşıntı, döküntü, deride kızarıklık, hırıltılı nefes, kan basıncında düşme veya bayılma olursa.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BECOVİTAL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Vitamin B'nin fazlası vücuttan atıldığından BECOVİTAL'in yan etkilere neden olması muhtemel değildir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314

00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. BECOVİTAL'in saklanması

BECOVİTAL 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BECOVİTAL 'i kullanmayınız.

Eğer ürün ve/veya ambalajında herhangi bir bozukluk fark ederseniz BECOVİTAL'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi: KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad. No: 64-66
Üsküdar / İSTANBUL
Telefon: (0212) 410 39 50
Faks: (0 212) 447 61 65

Üretim yeri: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Çerkezköy / Tekirdağ

Bu kullanma talimatı ../../. tarihinde onaylanmıştır.