

## KULLANMA TALİMATI

### CEFNOT 250 mg Efervesan Tablet

Ağız yoluyla alınır.

- **Etkin madde:** Her bir efervesan tablet 250 mg sefprozil içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Sitrik Asit Anhidr, sodyum hidrojen karbonat, Peg 6000, sukraloz (E 955), P.V.P.K-30, sodyum klorür, böğürtlen aroması

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek** veya **düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **CEFNOT nedir ve ne için kullanılır?**
2. **CEFNOT'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **CEFNOT nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **CEFNOT'un saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. CEFNOT nedir ve ne için kullanılır?**

CEFNOT'un etkin maddesi sefprozil, ikinci kuşak sefalosporinler olarak adlandırılan bir ilaç grubunda yer alır.

CEFNOT, krem renkli, yuvarlak, bir yz entikli efervesan tabletlerdir. 20 efervesan tablet ieren plastik tp silikajelli plastik kapak ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

CEFNOT, yetiřkinlerde boēaz, bademcik veya sins iltihabı gibi st solunum yolu enfeksiyonlarının, bronř iltihabı ve zatrre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarının, deri ve yumuřak doku enfeksiyonlarının ve kısa sreli idrar kesesi iltihabı (sistit) dahil komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

ocuklarda ise boēaz, bademcik, orta kulak veya sins iltihabı gibi st solunum yolu enfeksiyonlarının ve komplike olmayan deri ve yumuřak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

## **2. CEFNOT'u kullanmadan nce dikkat edilmesi gerekenler**

### **CEFNOT'u ařaēıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:**

Eēer;

- Sefprozil'e, sefalosporin grubu antibiyotiklere veya CEFNOT'un diēer bileřenlerine karřı ařırı duyarlı (alerjik) iseniz.

### **CEFNOT'u ařaēıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.**

Eēer;

- Penisiline karřı ařırı duyarlı (alerjik) iseniz,
- Tedavi sırasında ishal olursanız,
- Ciddi bbrek yetmezliēiniz varsa (bu durumda dozun deēiřtirilmesi gerekebilir),
- Gl idrar sktrc ilalar (diretikler) ile tedavi oluyorsanız.

CEFNOT'un uzun sre kullanımı duyarlı olmayan organizmaların geliřimine (sperenfeksiyona) neden olabilir. Eēer tedavi sırasında sperenfeksiyon oluřursa, uygun nlemlerin alınması gerekir.

CEFNOT, zellikle kalın barsak iltihabı olan ve mide-barsak ile ilgili hastalık gemiři olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Sefalosporin antibiyotiklerle tedavi sırasında pozitif Coombs testleri grlebilir.

CEFNOT'un 6 aydan kk bebeklerde kullanılması nerilmemektedir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **CEFNOR'un yiyecek ve içecek ile kullanılması**

CEFNOR'un yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Yemeklerden bağımsız olarak uygulanabilir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

CEFNOR kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Doktorunuz hamilelik esnasında CEFNOR kullanmanın potansiyel risklerinden bahsedecektir.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Eğer emziriyorsanız CEFNOR kullanırken dikkatli olunuz çünkü ilacın etkin maddesi az miktarda (% 0.3'ünden daha az) anne sütüne geçer.

### **Araç ve makine kullanımı**

CEFNOR'un araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

### **CEFNOR'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

CEFNOR içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

CEFNOR her dozunda 271,13 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı:**

Eğer;

- Aminoglikozit türevi bir antibiyotik kullanıyorsanız,
- Probenesid (ürik asit atılımını artıran bir ilaç) alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

- Güçlü diüretiklerle tedavi gören hastalarda sefalosporinler (CEFNOTOR dahil) dikkatli uygulanmalıdır.

CEFNOTOR bazı idrar ve kan testlerinin sonuçlarını etkileyebilir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. CEFNOTOR nasıl kullanılır?**

CEFNOTOR'u her zaman için tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız konularda doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

- CEFNOTOR tabletler duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda 12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde günde 500 ila 1000 mg dozlarda, 12 yaşından küçük çocuklarda ise günde 15-30 mg/kg dozlarda kullanılır. Çocuklarda dozun ayarlanabilmesi için sefprozil içeren oral süspansiyon formu kullanılır.
- Sizin için hangi dozun uygun olduğunu doktorunuz belirleyecektir. Doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.
- En yüksek günlük pediatrik doz, yetişkinler için önerilen günlük en yüksek dozu geçmemelidir.
- Üst solunum yolu enfeksiyonları ile deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının (Betahemolitik streptokok enfeksiyonlarının) tedavisinde, CEFNOTOR 10 gün süreyle uygulanmalıdır.
- İlacınızı her gün aynı zamanda almaya özen gösteriniz.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

- Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.
- CEFNOTOR tabletleri yemeklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz.

#### **Değişik yaş grupları**

##### **6 aydan küçük bebeklerde kullanımı:**

Yeterli çalışma olmadığından, CEFNOTOR'un 6 aydan küçük bebeklerde kullanılması önerilmemektedir.

**Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:**

CEFNOT 65 yaşın üzerindeki hastalarda kullanılırken doz ayarlanması gerekmez.

**Özel kullanım durumları**

**Böbrek yetmezliđi:** Ciddi böbrek yetmezliđi olan hastalarda CEFNOT dozunun ayarlanması gerekebilir.

*Eđer CEFNOT'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden fazla CEFNOT kullandıysanız:**

*CEFNOT'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**CEFNOT'u kullanmayı unutursanız:**

CEFNOT'u kullanmayı unutursanız, doktorunuza danışınız. Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**CEFNOT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Doktorunuz CEFNOT ile tedavinizin ne kadar süreceđini size bildirecektir. Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuza danışmadan tedaviyi erken kesmeyiniz.

Bu ilacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi CEFNOT'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa CEFNOT'u kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Kaşıntı,
- Ciltte kızarıklık,
- Döküntü,
- Yüz ve boğazda ödem,

- Rutin kan testlerinizde ALT ve AST olarak adlandırılan karaciğer enzim seviyelerinizde yükselme,
- Sarılık.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CEFNOR'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Kan testi sonuçlarınıza göre kandaki beyaz hücrelerin sayısının azalması (lökopeni),
- Kan testi sonuçlarınıza göre kan pulcuklarının azalması (trombositopeni),
- Kan testi sonuçlarınıza göre kanın pıhtılaşmasında (protrombin zamanında) uzama,
- Kan testi sonuçlarınıza göre kan üresinde ve serum kreatininde hafif yükselme,
- Pişik,
- İlaça duyarlı olmayan organizmaların gelişmesi (süperenfeksiyon),
- Genital kaşıntı, vajinada iltihaplanma,
- Ateş,
- Serum hastalığı (bazı ilaçların verilmesinden 7-12 gün sonra ortaya çıkan alerji tepkisi),
- Stevens Johnson sendromu,
- Kalın bağırsak iltihabı.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:**

- İshal,
- Bulantı,
- Kusma,
- Karın ağrısı,
- Baş dönmesi,
- Fiziksel ve ruhsal aşırı hareketlilik durumu,

- Bař ađrısı,
- Sinirlilik,
- Uykusuzluk,
- Zihin karıřıklığı,
- Uyuklama,
- Diřlerde renk deđiřmesi.

Bunlar CEFNOR'un hafif yan etkileridir.

bilgi edinilmesine katkı sađlamıř olacaksınız.

*Eđer bu kullanma talimatında bahsi geęmeyen herhangi bir yan etki ile karřılařırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemřireniz ile konuřunuz. Ayrıca karřılařtıđınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaę Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak T¼rkiye Farmakovijilans Merkezi (T¼FAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduđunuz ilacın g¼venliliđi hakkında daha fazla

#### **5. CEFNOR'un Saklanması**

*CEFNOR'u çocukların g¼remeyeceđi, eriřemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

CEFNOR'u 25°C'nin altındaki oda sıcaklıđında ve kuru yerde saklayınız.

Her kullanımdan sonra t¼p¼n kapađını kapatmayı unutmayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEFNOR'u kullanmayınız.*

Eđer ¼r¼nde ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CEFNOR'u kullanmayınız

**Ruhsat Sahibi:** Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.  
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü  
Teknoloji Geliştirme Bölgesi D1 Blok Kat:3  
Esenler / İSTANBUL  
Telefon: 0 850 201 23 23  
Faks: 0 212 482 24 78  
e-mail: bilgi@neutec.com.tr

**Üretim Yeri:** Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.  
1.OSB. 2.Yol No:2 Adapazarı / SAKARYA

*Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.*