

KULLANMA TALİMATI

CASENLAX 10 g oral çözelti hazırlamak için toz içeren saşe
Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir saşe 10 g Makrogol 4000 içerir.

Yardımcı maddeler: Sodyum sakarin (E954), elma aroması (doğal tatlandırıcı, maltodekstrin, arap zankı (E414), sülfür dioksit (E220), alfa-tokoferol (E307)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin/çocuğunuz için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size/çocuğunuza önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

- 1. CASENLAX nedir ve ne için kullanılır?***
- 2. CASENLAX'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
- 3. CASENLAX nasıl kullanılır?***
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?***
- 5. CASENLAX'ın saklanması***

Başlıkları yer almaktadır.

1. CASENLAX nedir ve ne için kullanılır?

CASENLAX, içerisinde elma kokulu ve aromalı beyaza yakın kuru toz bulunan, tek-dozlu saşeler halindedir. Etkin madde olarak makrogol (polietilen glikol) içerir, 20 adet saşe içeren kutu içerisinde ambalajlanır.

CASENLAX ozmotik laksatifler (dışkıyı yumuşatan müshil) olarak adlandırılan bir ilaç grubundandır. Ozmotik laksatifler dışkı içerisindeki su miktarında artış sağlar ve böylece dışkının bağırsaklardan geçişini kolaylaştırır.

CASENLAX yetişkinler ile 8 yaş ve üzeri çocuklarda kabızlığın belirtilerine yönelik (semptomatik) tedavisinde endikedir (kabızlığın nedenini tedavi etmekten çok, belirtilerini düzeltir).

Tüm laksatiflerde olduğu üzere kabızlık tedavisine başlanmadan önce, hastada herhangi bir organik hastalık varlığı hekim tarafından bertaraf edilmelidir.

Tedavi mutlaka sađlıklı bir yařam tarzı ve diyet ile desteklenmeli ve sadece geici olarak kullanılmalıdır.

ocuklarda kabızlık tedavisinde en fazla 3 ay sreyle uygulanır. 3 aydan daha uzun sreli kullanılmamalıdır.

Ara sıra grlen kabızlık:

Yařam tarzınızda meydana gelen herhangi bir deđiřiklik nedeniyle oluřabilir. Kısa sreli tedavi iin kullanılan ilalar mevcuttur. Yařam tarzı deđiřikliđi ile aıklanamayan veya ađrı, ateř, karında Őiřlik ile birlikte grlen kabızlıkta, doktorunuza mutlaka danıřın.

Kronik (uzun sreli) kabızlık:

Kronik kabızlık;

- Doktor tavsiyesi gerektiren bađırsak hastalıđı
- Diyet ve yařam tarzı deđiřikliklerine bađlı bađırsak fonksiyonlarında rahatsızlık (dengesizlik) sebebiyle meydana gelebilir.

Kronik kabızlık tedavisi;

- Diyetle birlikte lifli gıdaların alımının arttırılması (sebze, tam tahıllı ekmek ve meyve)
- Su ve meyve suyu alımının arttırılması
- Fiziksel aktivitenin arttırılması (spor, yryř)
- Dıřkılama refleksinde iyileřme ile birlikte dřnlmelidir.

Sađlıklı yařam tarzı ve diyet uygulanmasına rađmen kabızlık devam ederse, altta yatan bir sebepten Őphelenilmeli ve bu durum tedavi edilmelidir.

2. CASENLAX'ı kullanmadan nce dikkat edilmesi gerekenler

CASENLAX'ı ařađdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eđer;

- Makrogol (polietilen glikol) ya da CASENLAX ieriđindeki herhangi bir maddeye karřı alerjiniz (ařırı duyarlılık) varsa,
- Herhangi bir bađırsak hastalıđınız (zellikle kalın bađırsakta grlen lseratif kolit, Crohn hastalıđı gibi rahatsızlıklar) varsa
- Sebebi bilinmeyen karın ađrınız varsa
- Mide-bađırsak kanalında yırtılma, delinme (perforasyon) belirtileri ya da yırtılma, delinme riski varsa
- Bađırsak tıkanıklıđı belirtileriniz varsa

CASENLAX kullanılmamalıdır.

CASENLAX'ı ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Eđer CASENLAX kullanımından sonra diyare (ishal) oluřursa, elektrolit bozuklukları (kanda bazı tuzların azalması) geliřmesi riski mevcuttur. Bu risk yařlı hastalar, karaciđer ya da bbrek hastalıđı olan kiřiler veya diretik (idrar sktrc) ila kullanan hastalarda daha yksektir. Eđer bu hasta grubunda iseniz ve ishal meydana gelirse elektrolit seviyelerinizin kan testi ile kontrol iin mutlaka doktorunuza bařvurmalısınız.
 - ocuđunuza CASENLAX uygulamadan nce kabızlıđın herhangi bir organik sebep olasılıđı dıřlanması amacıyla mutlaka doktorunuza danıřın.
 - Tedaviden 3 ay sonra doktorunuz, ocuđunuzun klinik durumunu deđerlendirecektir.
- Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

CASENLAX 'ın yiyecek ve iecek ile kullanılması

Her CASENLAX uygulamasından sonra 125 ml sıvının (rneđin su) iilmesi nerilmektedir.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Hamileyseniz, hamile olduđunuzu dřnyorsanız, hamile kalmayı planlıyorsanız ilacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

CASENLAX emzirme dneminde kullanılabilir. Ancak bebeđinizi emziriyorsanız ilacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Ara ve makine kullanımı

CASENLAX'ın ara ve makine kullanımı zerine herhangi bir etkisi yoktur.

CASENLAX'ın ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında nemli bilgiler

CASENLAX her bir sařede 0,0000018 mg slfr dioksit iermektedir. Nadir olarak Őiddetli ařırı duyarlılık reaksiyonları ve bronkospazma (hava yollarının geici olarak daralmasına) neden olabilir.

Diđer ilalar ile birlikte kullanımı

Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise ltfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CASENLAX, beraber kullanılan diđer ilaların emilimini geciktirebilir, ilaların etkisini azaltabilir ya da ilaları etkisizleřtirebilir. Bu durumdan zellikle:

- Antiepileptikler (epilepsi/sara tedavisinde kullanılan ilalar),
- Digoksin (kalp yetmezliđinde kullanılan bir ila)
- Immnsupresifler (bađıřıklık sistemini baskılayan ilalar) ilalar etkilenebilmektedir.

3. CASENLAX nasıl kullanılır?

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

CASENLAX'ı doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.

Önerilen doz; tercihen sabahları tek doz olarak uygulanan günde 1-2 saşe'dir. Her uygulamadan sonra 125 ml sıvının (örneğin su) içilmesi önerilmektedir.

Günlük doz, elde edilen klinik etkiye göre ayarlanmalıdır. Doz; gün aşırı 1 saşe (özellikle çocuklarda) ile günde maksimum 2 saşe uygulanması arasında değişmektedir.

CASENLAX etkisini uygulandıktan sonraki 24 - 48 saat içinde gösterir.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

CASENLAX ağızdan alınır, tercihen sabahları uygulanır.

Her bir saşe içeriğini kullanmadan hemen önce bir bardak (en az 125 ml) suda çözünüz ve çözdükten sonra içiniz. Meydana gelen çözelti su gibi berrak ve şeffaf olacaktır.

CASENLAX kullandıktan sonra bağırsak hareketlerinizin sıklığındaki iyileşme, sağlıklı diyet ve yaşam tarzının sürdürülmesi ile sağlanacaktır.

- **Değişik yaş grupları:**

Çocuklarda ve ergenlerde kullanım:

Çocuklarda kullanım, 3 aydan uzun süreli tedaviye ait klinik veriler yetersiz olduğundan, 3 ayı geçmemelidir.

Tedavi kademeli olarak sonlandırılmalı ve kabızlık tekrarlırsa devam edilmelidir.

Yaşlılarda kullanım:

Özel bir kullanım durumu bulunmamaktadır.

- **Özel kullanım durumları:**

Böbrek yetmezliği:

Özel bir kullanım durumu bulunmamaktadır.

Karaciğer yetmezliği:

Özel bir kullanım durumu bulunmamaktadır.

Eğer CASENLAX'ın etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CASENLAX kullandıysanız:

CASENLAX'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CASENLAX'ın kullanmanız gerekenden daha fazla alınması ile ishal, karın ağrısı ve kusma oluşabilir. Bu etkiler ilacın geçici süreyle bırakılması ya da dozunun azaltılması ile geçer.

Eğer şiddetli ishal ya da kusma görülürse, sıvı kaybından dolayı elektrolit kaybını önlemek için tedaviye ihtiyaç duyabilirsiniz; bu sebeple en kısa sürede doktorunuz ile temasa geçiniz.

CASENLAX'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CASENLAX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

CASENLAX tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi, CASENLAX' ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CASENLAX'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

En şiddetli yan etkiler prurit (kaşıntılı kızarıklık), döküntü, yüz ödemi (yüzün şişmesi), Quincke ödemi (derinin derin tabakalarının hızlı bir şekilde şişmesi), ürtiker (kurdeşen) ve anafilaktik şokun dahil olduğu alerjik (hipersensitivite/aşırı duyarlılık) reaksiyonlarıdır. Görülme sıklığı yetişkin hastalarda çok seyrek (10000 hastanın birinden az görülebilir), pediyatrik hastalarda ise bilinmiyor (eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir) olarak bildirilmiştir.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CASENLAX'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın:	10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın:	10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan:	100 hastanın birinden az fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek:	1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Çok seyrek:	10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor:	Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Erişkinler:

Yan etkiler genel olarak önemsiz ve geçicidir ve çoğunlukla sindirim sistemini etkilemiştir:

Yaygın

- Karın ağrısı
- Karında şişlik
- Bulantı
- İshal (makat ağrısına neden olabilir)

Yaygın olmayan

- Kusma
- Acil defekasyon (dışkılama) ihtiyacı
- Fekal inkontinans (dışkı tutamama)

Bilinmiyor

- Elektrolit bozuklukları (sodyum ve potasyum gibi kan tuzlarının kan seviyelerinde düşüş, hiponatremi, hipokalemi)
- Özellikle yaşlı hastalarda şiddetli ishalin sebep olduğu dehidrasyon (su kaybı)
- Eritem (deri üzerinde oluşan kızarıklık)

Cocuklar/ ergenler

Yetişkin popülasyonunda olduğu üzere, yan etkiler genel olarak önemsiz ve geçicidir ve çoğunlukla sindirim sistemini etkilemiştir:

Yaygın

- Karın ağrısı
- İshal (anüs (makat) çevresinde ağrı meydana gelebilir)

Yaygın olmayan

- Kusma
- Şişkinlik hissi
- Bulantı

CASENLAX'ın yüksek dozlarda alınması ile ishal, karın ağrısı ve kusma oluşabilir. Bu etkiler ilacın geçici süreye bırakılması ya da dozunun azaltılması ile geçer.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. CASENLAX'ın saklanması

CASENLAX çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

CASENLAX ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CASENLAX'ı kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ç.O.S.B. Karaağaç Mah. Atatürk Cad.
No: 36 Kapaklı / TEKİRDAĞ
Tel : 0 282 999 16 00

Üretim Yeri:

Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ç.O.S.B. Karaağaç Mah. Atatürk Cad.
No: 36 Kapaklı / TEKİRDAĞ

Bu kullanma talimatı --/--/---- tarihinde onaylanmıştır.