

KULLANMA TALİMATI

İHTİYOL %10 merhem

Haricen kullanılır.

- *Etkin madde:* Her bir tüp 2 g ihtiyol içerir.
- *Yardımcı maddeler :* Beyaz vazelin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de İHTİYOL'den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
- Bu ilacın kullanımını sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek** veya **düşük** doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. İHTİYOL nedir ve ne için kullanılır?
2. İHTİYOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. İHTİYOL nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. İHTİYOL'ün saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. İHTİYOL nedir ve ne için kullanılır?

İHTİYOL 20 mg'lık alüminyum tüpte karton ambalajda sunulur. Kahverengi renkli, homojen krem kıvamındadır.

İHTİYOL, deriye sürülerek kullanılmak üzere hazırlanan, antiseptik ve dezenfektanlar adı verilen ilaçlar sınıfına giren bir merhemdir. Etkin maddesi ihtiyoldür.

İHTİYOL, lokal (bölgesel olarak uygulanan) antiseptik olarak veya iritan özelliğinden dolayı iltihabi hastalıkların (egzema, apse, çıban gibi) işletilerek aktılmasında ve diğer antiseptiklerle beraber kronik cilt rahatsızlıklarında tedaviye yardımcı olarak kullanılabilir.

2. İHTİYOL'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

İHTİYOL'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- Ürünün içeriğindeki maddelerden herhangi birine duyarlılığınız var ise

İHTİYOL'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ.

İHTİYOL'ü göz ve mukozalara (bazı organların iç yüzeylerini kaplayan ve salgı üreten deri tabakası) temas ettirmeyiniz.

İHTİYOL kullanımı esnasında enfekte bölge sıkılarak ya da bastırarak iltihabı çıkarmaya çalışılmamalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

İHTİYOL'un yiyecek ve içecek ile kullanılması:

Bilinen herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik esnasında İHTİYOL kullanımı doktor kontrolünde olmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

Emzirme döneminde doktorunuza danışmadan İHTİYOL kullanmayınız.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

İHTİYOL'un araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerine herhangi bir etkisi bildirilmemiştir.

İHTİYOL'un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler

Herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

İHTİYOL'un herhangi bir ilaçla etkileşimine rastlanmamıştır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. İHTİYOL nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günde bir kez veya gün aşırı hastalıklı deri bölgesine sürünüz.

Uygulama yolu ve metodu:

Haricen uygulanır.

Uygulama sırasında bir steril gazlı bez yardımı ile ilgili bölgeye tatbik edilir ve hava sirkülasyonunu önlemeyecek şekilde steril gazlı bez ile kapatılır. İltihaplı bölge sıkılarak ya da bastırarak iltihap çıkarılmaya çalışılmamalıdır. Uygulamadan sonra eller iyice yıkanmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda kullanımı ile ilgili yeterli veri mevcut değildir ancak; çocuk cildinin daha hassas olmasından dolayı bu hastalarda daha dikkatli kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda kullanımı ile ilgili yeterli veri mevcut değildir.

Özel kullanım durumları:**Böbrek yetmezliği:**

Bu hastalarda kullanımı ile ilgili yeterli veri mevcut değildir.

Karaciğer yetmezliği:

Bu hastalarda kullanımı ile ilgili yeterli veri mevcut değildir.

Eğer İHTİYOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla İHTİYOL kullandıysanız:

İHTİYOL'ü kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

İHTİYOL'ü kullanmayı unutursanız:

Eğer İHTİYOL'ü kullanmayı unutursanız, hatırladığınızda kullanınız, daha sonra tedavinize olağan şekilde devam ediniz. Yine de dozun atlandığını düşünüyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

İHTİYOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek olumsuz bir etki bulunmamaktadır.

Yarada iyileşme olana kadar kullanıma devam ediniz.

İHTİYOL almayı kesmeniz gereken durumlarda sizin için en iyi yöntemi doktorunuz belirleyecektir.

İHTİYOL kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, İHTİYOL'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın :10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın :10 hastada birden az, fakat 100 hastada birden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan:100 hastada birden az, fakat 1000 hastada birden fazla görülebilir.

Seyrek :1.000 hastada birden az görülebilir, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir

Çok seyrek :10.000 hastada birden az görülebilir.

Bilinmeyen :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

· Deride renk değişikliği

Yaygın olmayan:

- Kaşıntı, kızarıklık, alerjik reaksiyonlar

Seyrek:

- Deride irritasyon
- İzole olgularda kesecik oluşumu

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. İHTİYOL'un saklanması

İHTİYOL'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Bu ilacı, 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan uzakta ve kapağı kapalı olarak saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra İHTİYOL'ü kullanmayınız

Ruhsat sahibi: Bikar İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Güllübağlar Mah. Ankara Cad. Şirin Sok. No: 14 Pendik/İstanbul

Üretim yeri: Bikar İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Güllübağlar Mah. Ankara Cad. Şirin Sok. No: 14 Pendik/İstanbul

Bu kullanma talimatı...../...../..... tarihinde onaylanmıştır.