# KULLANMA TALİMATI

**GYREX$^{È}$ 25 mg film kaplı tablet**
**Aĵyēoluylanēarlē**

- ***Etkin madde*:** 25 mg ketiapine eкedĵer 28,78 mg ketiapin fumarat
- ***Yardēncē maddeler:*** Polivinil pirolidon, kalsiyum hidrojen fosfat dihidrat, mikrokristalin sel¿loz, solaktozumonohidrat, kasta g magnezyum stearat, polivinil alkol, tita demir oksit ve siyah demir oksit.

**Bu ilacē kullanmaya baкlamadan ce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, -¿ kn¿ sizin i-in ºemli bilgiler ier-mektedir.**

Å *Bu kullanma sakla yēnaēz. Daraokumaysoinhtuyabilirsiniz.*
Å *Eĝrilave sorularēnēz doktoruhuzarveyaecz, acēlnēdzfanēкēnēz.*
Å *Bu kilkaolarak sizin i-in re-ete edilmbikatlarvenēnyiniz.*
Å *Bu ilacēn kullanda doktoēa veyaēhastanesye gittidôktoruniza bu e ilkauclēlandyēleŷinēznēzēsº*
Å *Bu talimatta yazēlaynenuyuruuz-hakkēda size ºenilen dozun dēкēnda* ***y¿leksveyad¿кdezlkullanmayēznē***

**Bu Kullanma Talimatēnda:**

***1. GYREX$^{È}$ nedir ve ne i-in kullanēlēr?***
***2. GYREX$^{È}$ ôi kullanmadan ºnce dikkat edilmesi gere***
***3. GYREX$^{È}$ nasēl kullanēlēr?***
***4. Olasē yan etkiler nelerdir?***
***5. GYREX$^{È}$ ôin saklanmasē***

**Baкlēekalmarkētraydē**

**1. GYREX$^{È}$ nedir ve ne i-kullanēlēr?**

GYREX$^{È}$ tabletler, pembe renkli, yuvarlak, bombe kaplē tabletler кeklindedir.

GYREX$^{È}$, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

GYREX$^{È}$ etkin maddesi ketiapin olan, antipsikotikler (psikiyatrik hastalērkēteda davisinde kullanānilalar) olarak adlarēnbilē-grubuna ait bir ilat-ēr.

GYREX$^{È}$ sēĵēr kaynaklē laktoz monohidrat i-ermek

GYREX$^{È}$ aкaĵēdhaksitarlēedavisinde etkilidir:

Å Bipolar bozukluĵa eкleidek majdºepresif ataklar: Bu durumda kendinizi ¿zg¿n hissedersiniz. Karamsarlēsku-luluk, enerji kaybēi, akntazalmasē ve uykusuzluk hissedebilirsiniz.

- Bipolar bozuklukta orta-ileri derece mani ataklarında çok, heyecanlı, mutlu, merak veya hiperaktif olursunuz (uykuya her zamankinden daha az ihtiyaç duyar, daha konuşkan olursunuz, düşüncelerin veya fikirlerin hızlandığını fark edebilirsiniz) ya da sakinleşme veya yönlendirme dahil karar verme yeteneğinizde zafiyet olur.
- Daha önce ketiapin tedavisine cevap vermiş olan bipolar bozukluğu olan hastalarda mani ve depresif atakların önlenmesi sırasında.
- Şizofreni: gerçekte var olmayan şeyleri duyabilir veya hissedebilirsiniz; gerçekte olmayan şeylere inanırsınız; şüpheci, garip düşünceler dikkatinizi çekebilir, gerginlik, canınızı sıkabilir, endişelenebilirsiniz.

Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuz GYREX'e devam etmenizi yazmaya devam edebilir.

## 2. GYREX'in kullanımında dikkat edilmesi gerekenler

**GYREX'in bellek ve düşünce bozukluğuna yol açan beyin fonksiyon kaybı (demans) olan, ileri yaştaki hastalar tarafından kullanılmamalıdır. Bunun nedeni, GYREX'in önemli ölçüde bulunduğu grup tan olan ilaçlarla yapılan yaşlılarda herhangi bir etkinin olup olmadığının araştırılmamış olmasıdır.**

GYREX'in bu sınıftaki diğer ilaçlarla yapılan klinik çalışmalarında, demans ve bozukluğu olan yaşlı hastalarda görülen risklerin artmış olduğu GYREX'in bu tanımlamaya dahil olduğu düşünülmektedir.

**Antidepresan ilaçlarla özellikle çocuklar ve 24 yaşın altındaki gençlerdeki kullanımlarının intihar düşüncesi ya da davranışının artmış olasılığı ile bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinizin başlangıcında ve ilk aylarında veya dozunuzun artırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde sizde ortaya çıkabilecek huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişikliklerinde ya da intihar olaylarında doktorunuz sizi yakından takip edecektir. Durumunuzda herhangi bir kötüleşme olursa, intihar düşüncesi veya davranışı ya da kendinize zarar verme düşüncesi ortaya çıkarsa en kısa sürede doktorunuza yazınız.**
**GYREX'in 18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı önerilmez.**

**GYREX'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**
Eğer;
- Etkin madde ketiapine veya GYREX'in herhangi bir bileşenine (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,
- Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:
  - HIV tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi HIV-proteaz inhibitörü),
  - Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan bazı ilaçlar (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol gibi),
  - Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan eritromisin, klaritromisin gibi bazı ilaçlar,
  - Nefazodon gibi bazı depresyon ilaçları.

Eğer emin değilseniz GYREX almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

**GYREX'i ne zaman kullanmamalısınız**

Eğer;

- Sizde veya ailenizden birisinde kalp hastalığı varsa (örneğin kalp ritim bozukluğu, kalp kası enfeksiyonu veya kalp iltihaplanması varsa ya da kalp atımını etkileyen herhangi bir ilaç kullanıyorsanız),
- Tansiyonunuz düşük ise,
- Felç geçirdiyseniz veya özellikle ileri yaştaysanız,
- Karaciğer hastalığınız varsa,
- Kriz geçirmeniz (örneğin böbrek),
- Şeker hastalığınız (diyabet) veya çölyak hastası olma riskiniz varsa. GYREX'i kullanmadan önce doktorunuz kan şekeri seviyelerinizi kontrol edebilir.
- Geçmişte ilaçlardan kaynaklanan veya onlarla ilgisi bulunmayan herhangi bir nedenle akyuvar (beyaz kan hücresi) sayınızda düşüklük yaşadıysanız,
- Demans (beyinde işlev kaybı olan) ya da böbrek hastası iseniz. GYREX'i kullanmadan önce; GYREX'in ait olduğu grup ilaçlarla, demans nöbetleri ya da böbrek hastalığı riskini arttırabilir.
- Bu grup ilaçlar kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar kullanıyorsanız, sizde ya da ailenizde damar içinde kan pıhtılaşması öyküsü varsa,
- Normal gece uykusundayken kısa periyotlarda nefes durması (gece uyku apnesi olarak ifade edillir) durumu yaşıyorsanız veya yaşadıysanız ve aşırı gündüz uykusu normal beyin aktivitelerini yavaşlatıyorsa (depresanlar),
- Mesanenizi tamamen boşaltamayacağınız durumunuz (üriner retansiyon), büyümüş bir prostat, mesane çıkışında daralma veya ağrı-tıkanıklık varsa. Bu durumlar, bazen bazı tıbbi durumlar için tedavisinde sinir hücrelerinin işlevini etkileyen ilaçlardan ("anti-kolinerjikler") kaynaklanır.
- Toplar damarlarınızda bir probleminiz varsa. GYREX'in, seyrek olarak toplar damar tıkanıklığına neden olma riski bulunmaktadır. Tedavi öncesinde ve sırasında tıbbi risk faktörleri belirlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.
- Alkol veya ilaç ötesi kullanımınız varsa.

GYREX'i kullanmadan önce bu belirtilerden herhangi biri sizin için geçerliyse hemen doktorunuza danışınız:

- Nöroleptik malign sendrom olarak bilinen, ateş, kas tutulması, terleme ve bilinç kaybı gibi nadir görülen bir durum gelişirse. Bu durum tedavi gerektirebilir.
- Çığlık atma veya dilde konuşmalar gibi, istemsiz
- Bakım önü veya ciddi uykulu hissetme durumu. Bu, yaşlı hastalarda, kazalara bağlı yaralanma (düşme riski) ile ilişkilendirilebilir.
- Nöbetler,
- Uzun süreli veya ağrılı erkeklik organı (priapizm).

Böyle belirtilere bu tip ilaçlar sebep olabilir.

Eğer aşağıdaki belirtileri hissederseniz mümkün en kısa sürede doktorunuza söyleyiniz:

- Ateş, grip benzeri belirtiler, boğaz ağrısı veya diğer bir enfeksiyon kisi bunlar düşük akyuvar (beyaz kan hücresi) sayısı sonucu olup GYREX'in durdurulması ve/veya tedavi verilmesi gerekebilir.
- Şaşkınlık, sürekli endişe veya tedaviye cevap vermeyen kabızlık, bunu başka şeylerin de tetiklediği ileus gelişmiş olabilir.

**Å Ç n t idhkaresi ve depres y o n d æ mk º t ¿ l**

Depresyon ya kÿorsa n ebazen kendinize zarar verme veya º l mde¿ile rilgili d ¿ kcelem a k lzā gelebilir. Bu ila-lar ē n ¿ m ¿etkidine g º r ¿ lgemedlikleiya k l aiki hafka fakat bazen daha uzun s ¿ rÿ¿dde n, tedaviye ilk ba k l aÿ ē nsdaēar bu d ¿ kcelem artabilir. Bu d ¿ mcelerayn ēzamanda ilac ē zn ēalmay ēaniden b ā krm a duēuzunda da artabilir. E ÿr bir ge n -ye t i kenkizi bnºyse d ¿ k ēniz daha ola s ē dKēnik. - h ē kanda elde edilen bilgiler, depresyon g º ren¿ 25 ya k ē a t ēaki ge n - ye t i kerkle i ntihar d ¿ kcelem ve/veya intihar davra n ē riskinin daha y ¿ sek oldu unu g º s rmn ie k t i r .

Herhangi bir zamanda kendinize zarar verme veya º l d ¿d r¿ mcelerileri a k lzdan ē ge - rse derhal doktorunuzla temas kurun veya bir hastaneye ba k v u Bir akraba nzā veya ya k ē a kadaēk ēzan depresyon ge ir-di inizden bahsetmeniz ve onlardan bu kitap -ē ÿ ēokumala r ēistemēeniz yara r olabilir. Depresyonun k º etki ÿ i d ¿ k ēlem veya davra n ē a k ēdakē de ÿ i k i kkonusunda e m r d ienmelerli durumunda bunu size s ºylemelerini isteyebilirsiniz.

**Kilo alma**

GYREX È alan hastalarda kilo alma g º rm¿¿ lk t Siz ve. doktorunuz kilonuzu d ¿zenli olarak kontrol etmelisiniz.

**Çocuklar ve ergenler**

GYREX È -ocuklarda ve 18 ya k a l ergē enlerde kulla n ē l m a z .
Bu uya ra ē l g e m a i k therhangi bir d ºzeyde dahi olsa, sizin i - ge n rliyse l ¿entdoktorunuza da n ē k. ē n ē

**GYREX È ile yiyecek ve içecek ile kullanılması**

GYREX È ile yiyeceklerle beraber veya ayrē arak alabilirsiniz.

Ne kadar alkol ald ÿ ē zda dikkat ediniz. Ç ¿ n Ck GYREX È ile a l k ol birlikte m etkileri sizi uykulu yapabilir.

GYREX È tedavisi a lrken greyfurt suyu i meyiniz. Ç ÿ nkac ē n e t yolunu de ÿ imebilir. r

**Hamilelik**

*Ç dēa k u l l a ma doktorunuza veya eczac ē n a d a n ē k ē n ē z .*

E ÿer gebe oldu unuzu d ¿ k ÿorsa n ē veya hamile kalmay ēplanl ÿorsa nz ē GYREX È almadan ºnce doktorunuza da n ē k. ē Doktorunuzla g º r ¿ecem hamilelik esna s ē n d a GYREX È almam a l z. s ē n ē

Gebeli in son ¿ ay ēda, antipsikotik ila-lara (izofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik ha s t a l ēteklavisinde etkili) maruz kalan yeni do anlar, do umu takiben k i d d e t i de i k e b andrmealn ç kas hareketleri ve/veya ila - kesilme belirtileri a ē s a ēn risk a l t ēmlard Bu belirtiler, huzursuzluk, kasla r ēan k ēgerginli i, kaslar ēn gerginli ini yitirmesi, titreme, uykululuk hali, solunum g ¿ - l ÿ¿ veya beslenme bozuklukla r ē d E ÿer . bebe inizde bu belirtilerden herhangi biri ge l i e k, doktorunuzla temasa g e - melisiniz.

*Tedaviniz s ē r a ksamanda bir d u i farkederseniz hemen doktorunuza veya eczac ē n ē z a d a n ē k ē n ē z .*

**Emzirme**
*Kdēa kullaoe doktoduuza veyaeczacēa danēkēnēz.*

Kacēkullîēamsēdzboyeunca bebe înizi emzirmeyiniz.

**Ara ve makine kullanmēē**
Kullîēnbēiza -uykunuzu getirebilir. Bu tabletlerin sizi nas ētkiledi îni ºîrenene dek ara -ya da makine kullanmay ēzn ē

**GYREXÈ ôneriii -î ibuuldnan bazē dyēamēmaddeler ha kndaēºnemli bilgiler**
GYREXÈ bir keker tipi olan sē î ēr kaynaklēieri-il Eî ēr dabazºncedeno hidrat doktorunuz tara f ēambazēekerklere kar întolerans ē noðduzûsºylenmbiukrsēeb ri¿n ¿ almadan ºoe doktorunuzla temasa geiniz.

**Dierîila -lar ile birlikte kullanmēē**
Aκîēdaklair ēiklgyorsalnaēdoktorunuza bildiriniz.
- Aκîēdaklair ēAIDS (HIV) tedavisinde kullanēanbazēilalar (didanozin, lopinavir, ritonavir gibi HIV- proteaz inhieibi gibi), ºrl
- Mantar enfeksiyonlar ēntedavisi i - kullanēanl azol snēfilēalar (ketokonazol, flukonazol, itrakonazol gibi),
- Eritromisin veya klaritromisin (enfeksiyon tedavisinde kullan ē),lēr
- Nefazodon gibi depresyon ilalar ē

Aκîēdaklair ēiklgyorsalnaēdoktorunuza bildiriniz.
- Sara (epilepsi) ila -lar ē(fenitoin veya karbamazepin gibi),
- Tansiyon (y¿ksekkan basēnc-lar ē) illa
- Barbitratlar (uykusuzluk tedavisinde),
- Tiyoridazin veya lityum (di îer antipsikotik ilalar),
- Kalpatēmaēetkiēeden ilalar: Mesela dietçikler ( ēmdatcērgibi elektrolitlerin dengesizli îine (kanda potasyum ve magnezyumun d¿ kseviyelerde olmas ēneb ep olan ilalar ya da bazē aiyotikleir (enfeksiyonlar ēedavisinde kullanēanilla -lar) gibi,
- Kabzēlîēsebep olabilen ilalar,
- Bazētēhdburumlar ēntedavisinde sinir hcrelerinin iervindi etkileyen ilalar ("anti kolinerjik").

Herhangi bir ilac ēznēē kedeensmcºlnzfetn doktorunuzla konuκunuz.

*Eêr re -eteli ya da re - tesiz herhangi bir ilac ēκunda kullanēyeya sonsanēz zamanlarda kullandēeyndoktorunuza veya ecztaf ēnēza kkānndlarbhldgi veriniz.*

**Kndrda tarhmaa-sē**
Eîer idrarda ila - tarama sya p ēyorsa, GYREXÈ kullanmaeēleziyle metadon veya depresyon i -in kullanēanltrisiklik andidepresanlar (TSA) olarak adlandēanrilēalardan kullanmēyor olsdahmi,bazētest metotlarbēu ilalar i -pozitif sonaul ēnmaedeēna olabilir. Bºyle bir aslōeaçıklama spesifik testlerle sonu -lar ēnoîrudlanmageregekebilir.

## 3. GYREX® nasıl kullanılır?

**Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı ile ilgili özel talimatlar:**
GYREX® ilacınızı her zaman doktorunuzun talimatlarına uygun olarak kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Başlangıç dozunuza doktorunuz karar verecektir. Günlük doz (günlük hastalık şiddetine) ve ihtiyacınıza bağlı olarak genellikle 150 mg ila 800 mg arasında değişecektir.

**Uygulama yolu ve metodu:**
- Tabletlerinizi hastalığınıza bağlı olarak günde bir kez yatarken ya da günde iki defa alacak şekilde yutunuz.
- Tabletleriniz bütün, bir miktar suyla yutunuz.
- Tabletleriniz aç veya yemekle birlikte alabilirsiniz.
- GYREX® kullanırken greyfurt suyu içiniz. Kaçının etkiyi yolunu etkileyebilir.
- Doktorunuz size söylemeden, kendinizi iyi hissetseniz bile tabletlerinizi almayı durdurmayınız.

**Değişik kullanım durumları:**
**Çocuklar ve ergenlerde kullanımı:**
GYREX® çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmamalıdır.

**Yaşlılarda kullanımı:**
Yaşlılarda, doktorunuz dozunuzu değiştirebilir.

**Özel kullanım durumları**

**Böbrek yetmezliği**
Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması önerilmektedir.

**Karaciğer yetmezliği**
Karaciğer problemleriniz varsa doktorunuz dozunuzu değiştirebilir.

*Eğer GYREX® için tahminin çok güçleştiğini veya zayıflığı durumlar hakkında bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla GYREX® kullandıysanız**
*GYREX® dozunu kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız hemen bir doktor, veya eczacı ile haberleşiniz.*

Doktorunuzun sizin için reçete etmenize yazdığından daha fazla GYREX® almış iseniz uyuklamaya, sersemlik ve anormal kalp atışları hissedebilirsiniz. Doktorunuzla irtibata geçiniz ve doğruca en yakın hastaneye gidiniz. GYREX® tabletlerinizi yanınızda götürünüz.

**GYREX® kullanmayı unutursanız**
*Unutulan dozlar için çift doz almayınız.*

Unuttuğunuz tableti, bir sonraki dozun alınmasına çok yakın olmadığı sürece, hatırlar hatırlamaz hemen alınız.

**GYREX® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**
GYREX® kullanmayı aniden durdurursanız, uyuyamayabilirsiniz (uykusuzluk) ya da

kendinizi hasta hissedebilirsiniz (bulantı), veya tıbbi bakım gerektirebilecek, hasta olma (kusma), bakım durumlarında huzursuzluk halleri gelebilir.

Doktorunuz size tedaviyi durdurmadan önce, dozu yavaş yavaş kazalar önerebilir.

Bu ilaç kullanılgeçmişi sorularak kaydedilecektir, doktorunuza veya eczacı danışabilirsiniz.

**4. Olası etkileri nelerdir?**
Herkeste olduğu gibi bu ilaç da yan etkilere neden olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, GYREX® ilacı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**
- Nefes alma güçlüğü veya yüzün şişmesi gibi neden olabilen ciddi alerjik reaksiyonlar (anaflaktik reaksiyonlar).
- Deride kabarcıklar, deride kaşıntı veya vücudun herhangi bir yerinde ciddi alerjik reaksiyonlar.
- Deride ani kabarma, genellikle gözler, yüz, dudaklar ve boğazda şişme (anjiyoödem).

Bunlar hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin GYREX® ilacına karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi bir müdahaleye veya hastaneye yatış gerekli olabilir.

Bu yan etkiler sıklığına göre şöyle listelenir:

Yan etkiler şu şekilde sıklıklarına göre sıralanır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın en az, fakat 100 hastanın en fazla birinde görülebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın en az, fakat 1.000 hastanın en fazla birinde görülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın en az, fakat 10.000 hastanın en fazla birinde görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın en az birinde görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

GYREX® ilacının yan etkileri şunlardır:

**Çok yaygın:**
- Bakım değişikliğine bağlı yan neden olabilir), bakım işçeğe duruluşu,
- Uyuklama hali (GYREX® almaya devam etti inizde zamanla geçebilir) (dikkat neden olabilir),
- Kaçınılmaz semptomlar (GYREX® kullanmayı kesti inizde görülebilir); bunlara uyuyamama (uykusuzluk), hasta olma (bulantı), bakım değişikliğine bağlı, hasta olma (kusma), bakım durumlarında huzursuzluk dahildir. Kaçınılmaz en az 1 ila 2 haftalık bir periyotta kademeli olarak kesilmelidir.
- Kilo alımı
- Anormal kas hareketleri. Bunlara kas hareketlerinin bakım asında zorluk, titreme, rahatsızlığa yol açan kasılmalar dahildir.
- Bazı yağlar ve toplam kolesterol).

**Yaygın:**
- Kalp çarpıntısı, taşikardi),
- Kalp çok güçlü çarpıyor, çok hızlı atıyor ya da kalp atışını rahatsız edici bir şekilde oluyor gibi hissetmek,
- Kabızlık, bozukluğu (hazımsızlık),

- Halsizlik ve güçsüzlük hissi,
- Kol veya bacaklarda kramp,
- Ayağa kalkıldığında basınç düşmesine (ortostatik hipotansiyon) ve buna bağlı olarak bayılma nöbetlerine sebebiyet verebilecek kan basıncında düşme,
- Kan ekmeklerinin yükselmesi,
- Bulantı,
- Anormal rüyalar ve kabuslar,
- Aşırı ölçüde hassasiyet (ışığa),
- Uyaranlara karşı artmış duyarlılık,
- Konuşmede telaffuzda güçlük,
- Depresyonda artış ihtimali ve dolayısıyla intihar düşünceleri,
- Nefes darlığı,
- Kusma (özellikle yakın dönemde),
- Ateş,
- Kandaki tiroid hormonlarının düşmesi, tiroid bezinin büyümesi, tiroid bezinde kanser gelişmesi,
- Bazı kemik iliği hücrelerinin sayılarında azalmalar,
- Kandaki böbrek üstü bezi enzimleri miktarlarında artış,
- Kandaki prolaktin hormonu miktarında artış. Prolaktin hormonunun yükselmesi nadir vakalarda aşağıdakilere yol açabilir:
  - Erkeklerde ve kadınlarda memede büyüme, beklenmeyen süt gelmesi.
  - Kadınlarda adet görmemesi ya da düzensiz adet görmesi.

**Yaygın olmayan:**
- Nöbetler,
- Deride kabarcıklar, dilde şişme, deride aşırı hassasiyet, ciddi alerjik reaksiyonlar,
- Bacaklarda huzursuzluk hissi (huzursuz bacak sendromu olarak da adlandırılır),
- Yutkunmada güçlük,
- Özellikle yüzde ve dilde istemdışı hareketler, hafıza,
- Cinsel aktivitede bozukluk,
- Şeker hastalığı (diyabet),
- EKG'de görülen, kalbin elektriksel aktivitesindeki değişiklik (QT uzaması),
- Tedaviye başlanırken ölümcül olabilecek kalp hızında düşme ve düşük kan basıncı bayılmalara yol açabilir, ilişkili
- Şekerin yapma güçlüğü,
- Bayılma (nöbetlere bağlı olmayan),
- Geniz tıkanıklığı,
- Alyuvar (kırmızı kan hücresi) miktarında azalma,
- Kandaki sodyum miktarında azalma,
- Nöbet,
- Üreden var olan şeker hastalığı (diyabet) kötüleşmesi

**Seyrek:**
- Ateş titreme, kaslarda sertleşme, uykulu hissetme ya da bayılmaların kombinasyonu (nöroleptik malign sendrom olarak adlandırılır bozukluk),
- Deride ve gözlerde sararma (sarılık),
- Karaciğer hasarı (hepatit),
- Priapizm (uzun ve ağrılı erksiyon),
- Göğüslerde büyüme, beklenmeyen süt gelmesi (galaktore),
- Adet düzensizliği,

- Göğüs ağrısı (anjina pektoris) veya daha önce kalp krizi geçirmiş olmak,
- Uyku halindeyken yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, yemek yemek ve diğer aktivitelerde bulunmak,
- Vücut taksi şöförünün anlamasına (örneğin), pot
- Pankreas iltihabı,
- Aşırı derecede yüksek durumun veya daha fazla sabit kalan bir durum (metabolik sendrom da denir): Karbonhidrat yiyecekleri ve şekeri (HDL-K) de azalma, kanda trigliseridler denilen yağ tipinde artış, şekerli kan basıncında şeker artışı,
- Ağrı ile ortaya çıkan bir durum; dış kaynaklı kan hücresi sayısı ile ateş grip benzeri belirtiler, akciğer yaşında bir enfeksiyon,
- Bağırsak anormalliği,
- Kanda kreatin fosfokinaz seviyelerinde artış (kaslardaki bir madde),
- Normal gece uykusundayken nefes durmasına (uyku apnesi).

**Çok seyrek:**
- Şiddetli bir reaksiyonda kişinin kendisini kötü hissetmesine sebep olan,
- Nefes almada güçlüğe yol açan ciddi alerjik reaksiyon (anaflaksi),
- Deride ani kabarma, genellikle göz çevresi, dudaklar ve boğazda (anjiyoödem),
- Deri, ağız, göz ve genital bölgelerde kızıl döküntü durumu (Stevens-Johnson sendromu),
- Kişinin idrar hacmini ayarlayan hormonun uygunsuz salgılanması,
- Kas liflerinin yıkılmasında artışa bağlı (miyoliz).

**Bilinmiyor:**
- Düzensiz kırmızı renk lekelerle birlikte deri döküntüsü (eritema multiforme),
- Ateş, deride kabarcıklanma ve mukozanın soyulma gibi belirtilerin görüldüğü ciddi, ani alerjik reaksiyon (toksik epidermal nekroliz),
- Hamilelerin GYREX'i kullanımı ile bağlantılı olarak yeni doğan bebeklerde ilaç kesilme belirtilerinin görülmesi.

GYREX'in dahil olduğu ilaç grubu, ciddi ve ölümcül olabilecek kalp ritim bozukluklarına sebep olabilir.

Bazı etkiler sadece kan testiyle görülebilir. Bunlara kandaki bazı yağların (trigliseridler ve total kolestrol) ve şeker miktarının değişikliği, kandaki steroid hormonların miktarının değişikliği, karaciğer enzimlerinde artış, bazı kan hücrelerinin sayısında azalma, kırmızı kan hücrelerinin miktarında azalma, kan kreatin fosfokinaz miktarının (kaslardaki bir madde) artışı ve kanda prolaktin hormonunun miktarının artışı dahildir. Prolaktin hormonundaki artış nadiren aşağıdaki durumlara neden olabilir:

- Kadın ve erkekl