

KULLANMA TAL MATI

MADEF X %1 merhem
Cilt üzerine uygulanır.

-) **Etkin madde:** 1 g merhem 10 mg *Centella asiatica*'nın titre edilmi ekstresini içerir.
-) **Yardımcı maddeler:** Gliserol monostearat, propilen glikol, kalın likit parafin, ıtır ya 1, lavanta ya 1, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya ba lamadan önce bu KULLANMA TAL MATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. E er ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danı ınız. Bu ilaç ki isel olarak size reçete edilmi tir, ba kalarına vermeyiniz. Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gitti inizde bu ilacı kullandı ınızı doktorunuza söyleyiniz. Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. laç hakkında size önerilen dozun dı ında yüksek veya dü ük doz kullanmayınız.

Kullanma Talimatında:

- 1. MADEF X nedir ve ne için kullanılır?**
- 2. MADEF X'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
- 3. MADEF X nasıl kullanılır?**
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?**
- 5. MADEF X' in saklanması**

Ba lıkları yer almaktadır.

1. MADEF X nedir ve ne için kullanılır?

1 g merhem 10 mg *Centella asiatica*'nın titre edilmi ekstresini içerir.

MADEF X 40g' lık ambalajlarda sunulmaktadır.

MADEF X, yüzeysel 1. ve 2. derece yanıklar, bölgesel deri ülserleri, yatak yaraları, meme ba ı çatlak ve yarıkları, sünnet, genital bölge yırtılmaları, do uma yardımcı olmak amacıyla uygulanan küçük cerrahi müdahalelerde, radyasyon tedavisi sonrasında olu abilecek cilt hasarlarında iyile me sa lanması için kullanılmaktadır.

2. MADEF X'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MADEF X'i a a ıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

E er;

- lacın içindeki maddelerden herhangi birine kar ı alerjiniz var ise,
- Süperenfekte lezyonlarda (iyile mesi bir enfeksiyonunuz varken yeni bir enfeksiyon geli mesi durumunda)

MADEF X'i a a ıdaki durumlarda D KKATL KULLANINIZ:

MADEF X'i gözlerinize ya da yumu ama e ilimi olan dokular üzerine uygulamayınız.

MADEF X'in yiyecek ve iecek ile kullanılması

MADEF X'in herhangi bir yiyecek ya da iecek ile kullanımını kısıtlayacak herhangi bir bilgi yoktur.

Hamilelik

lacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı ınız.

MADEF X hamilelik döneminde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile oldu unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danı ınız.

Emzirme

lacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danı ınız.

MADEF X'in emzirme döneminde kullanımı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

Ara ve makine kullanımı

MADEF X'in ara ve makine kullanımına herhangi bir etkisi bildirilmemi tir.

MADEF X'in ieri inde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MADEF X propilen glikol ierir. Propilen glikol ciltte tahri e neden olabilir.

Di er ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldı ında MADEF X'in ya da kullanılan di er ilacın etkisinin de i ebilece i konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

E er reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı u anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MADEF X nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça günde 1-2 kez uygulayınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Kapağı ters çevirerek tüpü deliniz ve yara üzerine ince bir tabaka halinde sürünüz.

Doktorunuz MADEF X ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

Değerli yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Özel popülasyonlara ilişkin klinik çalışmaları bulunmadığından doz bilgisi mevcut değildir.

Yaşlılarda kullanımı:

Özel popülasyonlara ilişkin klinik çalışmaları bulunmadığından doz bilgisi mevcut değildir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Özel popülasyonlara ilişkin klinik çalışmaları bulunmadığından doz bilgisi mevcut değildir.

Karaciğer yetmezliği:

Özel popülasyonlara ilişkin klinik çalışmaları bulunmadığından doz bilgisi mevcut değildir.

Eğer MADEF X'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduysanız bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınıza iletişiniz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MADEF X kullandıysanız:

MADEF X'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

MADEF X'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MADEF X'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MADEF X'i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Alerjik reaksiyonlar
- Cilt döküntüsü
- Kızarıklık ve içi su dolu kabartılar (kurdeşen)
- Kaşıntı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MADEF X'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

A a ıdaki yan etkiyi fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Cilt hassasiyeti

Bu, MADEF X' in hafif yan etkisidir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlanabilecektir.

5. MADEF X'in saklanması

MADEF X'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MADEF X'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MADEF X'i kullanmayınız. Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi:

Si Pharma İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Tatlısu Mah. Haliç Sok. 31/56

Ümraniye/ İstanbul

Tel: 0 (216) 594 52 72

Fax: 0 (216) 594 55 52

Üretim Yeri:

Vefa İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Beylikdüzü Org. San.Bölgesi Mermereiler San. Sitesi 2. Cadde no:3

Beylikdüzü/ İstanbul

Bu kullanma talimatı 25.01.2018 tarihinde onaylanmıştır.